

بمناسبة اليوم العالى للامتناع عن تعاطى التبغ

22.7٪ من المصريين مدخنون في 2017

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 30 / 5 / 2019 بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

يتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "التبغ والصحة الرئوية" ، حيث تدعو المنظمة إلى رفع وعي الأفراد والمؤسسات بالجوانب التالية:

- التأثير السلبي للتبغ على الصحة الرئوية، من الإصابة بالسرطان إلى الأمراض التنفسية المزمنة.
 - الأهمية الرئيسية للرئتين في تمتع الناس كافة بالصحة والعافية.

فى ضوء بيانات المسح القومي متعدد المراحل لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير السارية لجمهورية مصر العربية لعام 2017 والذي تم تنفيذه بالشراكة بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، كانت أهم نتائجه فيما يتعلق بالتدخين كالآتى :

- بلغت نسبة الأفراد الذين يدخنون حالياً أى منتج من منتجات التبخ المصنع في العمر (15 ـ 69 سنة) 22.7٪، وتعتبر ظاهرة التدخين في مصر شائعة بين الذكور أكثر منها بين الإناث حيث بلغت النسبة 43.4٪ للذكور مقابل 0.5٪ للإناث.
- بلغت أعلى نسبة من المدخنين الحاليين الذين يدخنون أى نوع من أنواع التبغ المصنع 27.3٪ في الفئة العمرية (30-44 سنة) (52.6٪ للذكور، 0.5٪ للإناث).
- بلغ متوسط السن عند بداية التدخين 18.1سنة، وينخفض متوسط سن بداية التدخين من 15.9 سنة للمدخنين الحاليين
- 40.3 43.4 40.3 43.4 27.3 27.1 22.1 22.7 22.1 22.7 29-15 44-30 59-45 69-60 الإجمالي كالمائية المائية ا

نسبة المدخنين الحاليين (15 - 69 سنة) لأى منتج من

منتجات التبغ المصنع (السجائر /السيجار / الشيشة) وفقاً

لفئات السن والنوع - 2017


60 ½

الذكور في الفئة العمرية (15_29سنة) مقارنة بالفئة العمرية (60_ 69 سنة) حيث بلغ 21.1 سنة، مما يشير الى شيوع التدخين في الأعمار الصغيرة حالياً أكثر من ذي قبل.

• ارتفاع نسبة المدخنين الحاليين من الذكور للسجائر العادية المصنعة لتبلغ 82.7٪ من إجمالي المدخنين بمتوسط

عدد سجائر مستهلكة في اليوم بلغ 15.9 سيجارة ، يلي ذلك نسبة مدخني الشيشة حوالي 20٪ بمتوسط استهلاك 0.6 حجر في اليوم، بينما كانت نسبة مدخني السيجار 6.2٪ بمتوسط استهلاك 0.9 سيجار في اليوم.


متوسط السن للمدخنين الحاليين من الذكور (15–69سنة) عند بداية التدخين وفقاً لفئات السن –2017



• نسبة من سبق لهم التدخين بصفة يومية والمقلعين عنه حالياً بلغت 5.4٪ (10.3٪ للـذكور، 0.1٪ للإناث)، وتشير البيانات إلى أن نسبة المدخنين الحاليين من الذكور الذين نصحهم الطبيب بالإقلاع عن التدخين خلال الإثنى

عشر شهراً السابقة على المسح كانت 28.3٪، وهناك 40.4٪ من المدخنين حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال الإثنى عشر شهراً السابقة للمسح.

• بلغت نسبة الافراد (15-69سنة) الذين شملهم المسح والمعرضين لدخان التبغ في المنزل (التدخين السلبي) خلال الثلاثين يوما السابقة للمسح 48.9 / 48.9 (49.8 / 49.8 / للذكور ، 47.8 / للإناث)، وبلغت نسبة المعرضين لدخان التبغ في أماكن العمل 30.3 / 42. للذكور ، 17.8 / للإناث)، كانت أعلى نسبة لهولاء الافراد في الفئية العمرية



(30. 44سنة) حيث بلغت 33.5٪ (47.5٪ للذكور، 18.7٪ للإناث) بينما كانت اقىل نسبة 17.5٪ في الفئة العمرية (60. 60) سنة (21.3٪ للذكور، 13٪ للإناث).

مصدر البيانات:

المسح القومي متعدد المراحل لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير السارية لجمهورية مصر العربية لعام 2017 ـ تم تنفيذه بالشراكة بين
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

ص.ب. 2086 صلاح سالم – مدينة نصر / القاهرة . 2086 مصابح سالم – مدينة نصر / القاهرة . 2086 (02)24024099 علاح سالم القاهرة . (02)24024099 (02) وكاسة الجهاز فاكس (02)24024099 (02)24024099 المركز القومي للمعلومات: http://www.capmas.gov.eg موقع الجهاز: Email: pres_capmas@capmas.gov.eg