




جمهورية مصر العربية
الاجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

المسح الصحي للأسرة المصرية

EGYPT FAMILY HEALTH SURVEY
EFHS 2021



المؤشرات



إصدار: يونيو ٢٠٢٢
ISSUE: JUNE 2022

مقدمة

تمثل الصحة للجميع أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، باعتبارها من الركائز الأساسية لضمان جودة الحياة التي تعتبر الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه كافة برامج الحكومة. وقد شهدت الفترة الأخيرة اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة من خلال العديد من المبادرات في هذا المجال مثل مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، مبادرة 100 مليون صحة، وكذا مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الحالة الصحية للأطفال وطلبة المدارس، وجميعها كان لها آثارها الإيجابية في الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن، والتقليل من الآثار السلبية لجائحة كورونا التي تعرض لها العالم منذ نهاية عام 2019.

ولمتابعة وتقييم الإنجازات في مجال التنمية الصحية، كان من الضروري الاعتماد على بيانات محدثة تتسم بالدقة ويمكن الوثوق بها، ومن هنا كان اهتمام الدولة بتنفيذ المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، والذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأول مرة، بناء على توجيهات القيادة السياسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة توفر الأدلة لبلورة وصياغة السياسات المناسبة.

ويأتي المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، استمراراً لسلسلة المسوح السكانية الصحية التي بدأت منذ عام 1988 وتم في إطارها تنفيذ سبعة مسوح كان آخرها في عام 2014. وقد حرص الجهاز على تطبيق نفس المنهجيات حتى يمكن مقارنة النتائج مع مثيلتها الصادرة عن المسوح السابقة.

ويعرض هذا التقرير النتائج الأساسية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021 والتي تغطي المؤشرات الأساسية لصحة الأم والطفل، وتشمل مستويات الإنجاب وتنظيم الأسرة ورعاية الحمل، بالإضافة إلى وفيات الأطفال والتطعيمات وأمراض الطفولة والحالة التغذوية. ويشير التقرير أيضاً إلى عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل والعنف ضد المرأة، وخاصة الختان، كما يتعرض لاتجاهات الشباب حول تنظيم الأسرة والعدد الأمثل من الأطفال.

وتعد نتائج هذا المسح أساساً لقياس إنجازات البرامج السكانية الصحية، كما أنها توفر قاعدة بيانات هامة لتحديد التدخلات المستقبلية المطلوبة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتحديات الصحية.

وفى ختام كلمتي أتوجه بالشكر إلى كل المشاركين والداعمين لهذا العمل القومي الهام، وعلى رأسهم القيادة السياسية، وزارة الصحة والسكان، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك لكل من شاركوا في إنجاز هذا المسح من خبراء وعاملين سواء من أبناء الجهاز أو من خارج الجهاز.

والله الموفق.

لواء أ. ح. / خيرت محمد بركات

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

خلفية المسح

المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 هو مسح قومي تم إجراؤه بأسلوب العينة، وذلك بهدف توفير معلومات عن الإنجاب وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الحالة الصحية للأطفال في مصر. كما أن المسح يوفر معلومات عن الأمراض المختلفة مثل مرض فقر الدم (الأنيميا)، أمراض سوء التغذية (التقرم، النحافة/البدانة). بالإضافة إلى ذلك يوفر المسح العديد من مؤشرات التنمية المستدامة. وقد تم تنفيذ هذا المسح بتمويل من الحكومة المصرية لأول مرة وباستخدام نفس منهجية المسوح السكانية الصحية التي كان يتم تنفيذها في مصر حتى عام 2014 وذلك حتى يمكن مقارنة النتائج مع نتائج المسوح السكانية الصحية السابقة. ويوفر المسح كما تم ذكره بيانات لمتابعة وتقييم الإنجازات في مجال التنمية الصحية. ويعتبر هذا المسح بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدرها الجهاز المركزي في غاية الأهمية من أجل قياس إنجازات البرامج الخاصة بتنظيم الأسرة والسكان والبرامج الصحية بالإضافة إلى المساعدة في التخطيط للبرامج والتدخلات المطلوبة مستقبلاً لمواجهة التحديات التي أظهرها المسح.

وقد تم تنفيذ هذا المسح بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وقد تم البدء في الإعداد للمسح في أغسطس 2020 وكان من المفترض أن يتم جمع البيانات في أواخر عام 2020، ولكن نتيجة لانتشار جائحة الكورونا وحدث إغلاق جزئي في أواخر عام 2020 ثم تأجيل المسح حوالي تسعة أشهر ليبدأ جمع البيانات في أكتوبر 2021 ولمدة ثلاثة أشهر.

ويعرض هذا التقرير أهم النتائج المتعلقة بالموضوعات الأساسية في المسح. ويجب مراعاة أن هذه النتائج تعتبر أولية وقد تحدث بعض التغيرات أثناء أعداد التقرير النهائي للمسح والذي سيكون أكثر تفصيلاً ويتوقع نشره خلال هذا العام.

منهجية وعينة المسح

تم تحديد حجم العينة بحيث تعطي تقديرات على مستوى الجمهورية والمناطق الجغرافية المختلفة. كما يسمح تصميم وحجم العينة باستخراج عدد كبير من المؤشرات على مستوى المحافظات المختلفة.

وقد تم استخدام العينة الأساسية التي تم إعدادها من تعداد السكان لعام 2017 والتي تشمل 1348 قطعه مساحية كإطار لعينة المسح الصحي للأسرة المصرية. وقد قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء حصر للأسر المعيشية في هذه القطع المساحية.

وقد تم اختيار عينة المسح على مرحلتين. تم في المرحلة الأولى اختيار القطع المساحية، والتي بلغت 627 قطعة مساحية بالحضر و721 قطعة مساحية في الريف موزعة على جميع محافظات الجمهورية (يصل إجمالي عدد القطع المساحية إلى 1348 قطعة مساحية).

وقد تم في المرحلة الثانية اختيار 25 أسرة معيشية من كل قطعة مساحية ماعدا محافظات الحدود فقد تم اختيار 35 أسرة من القطعة المساحية ليصل حجم العينة إلى 34282 أسرة معيشية ممثلة لأسر الجمهورية.

تغطية المسح

تم من خلال المسح مقابلة عدد 30667 أسرة معيشية بنسبة استجابة 93.2٪، ويعرض جدول (1) عدد الأسر التي تم اختيارها والتي تمت مقابلتها. وتشير البيانات إلى وجود حوالي 1370 من الأسر لم يتم الوصول إليها (4 ٪). وقد تم تحديد عدد 21267 سيدة مؤهلة للمقابلة في هذه الأسر، وتم فعلياً مقابلة 20481 سيدة بنسبة استجابة 96.3 ٪، كما تم خلال المسح مقابلة عدد 17603 من الشباب (ذكور وإناث) في العمر 15–29 سنة بنسبة استجابة 82.3 ٪.



جدول (1): نتائج مقابلات الأسر المعيشية والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج

أعداد الأسر المعيشية، والسيدات المؤهلات اللاتي سبق لهن الزواج، والشباب/الشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 سنة حسب نتيجة المقابلة ونسب الاستجابة حسب مكان الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة (غير مرجح)، المسح الصحي للأسرة المصرية - مصر 2021

الإجمالي	محل الإقامة								الإقامة		نتيجة المقابلة ونسبة الاستجابة
	محافظة الحدود ⁽¹⁾	وجه قبلي			وجه بحري			محافظة حضرية			
		ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي				
									ريف	حضر	
											الأسر المعيشية
34282	1892	8592	4193	12785	8947	4130	13077	6528	18062	16220	المختارة
32912	1826	8361	3992	12353	8669	3949	12618	6115	17541	15371	الموجودة
30667	1565	8033	3717	11750	8318	3586	11904	5448	16807	13860	تمت
93.2	85.7	96.1	93.1	95.1	96.0	90.8	94.3	89.1	95.8	90.2	نسبة الاستجابة في الأسر المعيشية ⁽²⁾
											السيدات المؤهلات
21267	1136	6238	2389	8627	6072	2214	8286	3218	12657	8610	تم تحديدهن
20481	1089	6123	2276	8399	5883	2103	7986	3007	12343	8138	تمت مقابلتهن
96.3	95.9	98.2	95.3	97.4	96.9	95.0	96.4	93.4	97.5	94.5	نسبة الاستجابة للسيدات ⁽³⁾
											الشباب/الشابات المؤهلين
21394	1242	5681	2804	8485	5200	2546	7746	3921	11212	10182	تم تحديدهم
17603	1014	4738	2353	7091	4207	2069	6276	3222	9219	8384	تمت مقابلتهم
82.3	81.6	83.4	83.9	83.6	80.9	81.3	81.0	82.2	82.2	82.3	نسبة الاستجابة للشباب/الشابات ⁽⁴⁾

(1) لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

(2) الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها / الأسر المعيشية الموجودة.

(3) السيدات المؤهلات اللاتي تمت مقابلتهن / السيدات المؤهلات اللاتي تم تحديدهن.

(4) الشباب أو الشباب المؤهلين الذين تمت مقابلتهم / الشباب أو الشباب المؤهلين الذين تم تحديدهم.

خصائص الأسر المعيشية والمستجيبات


خصائص الأسر المعيشية:

تم خلال المسح مقابلة أكثر من 30000 أسرة معيشية، وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية 4.04 فردًا مقابل 4.1 فردًا في عام 2014. وقد وجد أن حوالي 17 % من الأسر ترأسها سيدة بزيادة أربعة نقاط عن مسح 2014. وقد وجد أن حوالي 40 % من أفراد الأسر المعيشية أقل من 20 عاماً.

الدعم الحكومي:

وتحصل حوالي 10 % من الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها في المسح على دعم حكومي من برنامج كرامة وتكافل. وتشير البيانات إلى أن نسبة الأسر التي تحصل على دعم من برنامج كرامة وتكافل تصل إلى أقل ما يمكن في المحافظات الحضرية ومحافظات الحدود (5.4 %) بينما تصل إلى أعلى مستوى في الوجه القبلي (16 %)، وخاصة في ريف الوجه القبلي (19 %).

وتشير البيانات أن حوالي 88 % من الأسر لديها بطاقة تموين، و6 % تحصل على معاش الضمان، وحوالي 2.4 % من الأسر المعيشية قد حصلت على معاش العمالة المؤقتة أثناء جائحة فيروس كورونا.



خصائص المستجيبات:

تشير النتائج في جدول (2) إلى أن أقل من 29 % من المستجيبات عمرهن أقل من 30 سنة، وحوالي 2 % فقط في الفئة العمرية 15-19 سنة، وحوالي 71 % عمرهن 30 سنة أو أكثر. غالبية السيدات اللاتي تمت مقابلتهم متزوجات (93 %)، وحوالي 4 % مطلقات/منفصلات، و3 % أرامل.

تقطن 38 % فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 سنة في الحضر و62 % يقطن في الريف. أما بالنسبة لمحل الإقامة، فقد وجد أن حوالي 15 % يقيمون في المحافظات الحضرية، 45 % في الوجه البحري، 39 % في الوجه القبلي، بينما 1 % فقط يقيمون في محافظات الحدود.

بالنسبة للحالة التعليمية للسيدات، فتشير النتائج إلى تحسن الحالة التعليمية للسيدات في مصر، حيث نجد أن 58 % من السيدات حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى، بالإضافة إلى 20 % أتممن المرحلة الابتدائية حتى بعض من التعليم الثانوي، مع وجود 16 % لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم مقابل 24 % في مسح 2014.



وتؤكد النتائج تدني مستوى مشاركة النساء في سوق العمل، حيث وجد أن 17 % فقط من السيدات ذكرن أنهن يعملن مقابل عائد نقدي مقارنة بـ 14 % في مسح 2014.

جدول (2): توزيع المستجيبات حسب العمر، محل الإقامة والحالة العملية

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 حسب العمر ومحل الإقامة والحالة العملية، المسح الصحي للأسرة المصرية - مصر 2021


الخصائص الخلفية	النسبة المرحجة	العدد المرجح	العدد غير المرجح
العمر			
19 – 15	1.9	397	397
24 – 20	10.8	2220	2157
29 – 25	15.9	3247	3267
34 – 30	20.0	4091	4135
39 – 35	20.5	4207	4195
44 – 40	17.6	3595	3586
49 – 45	13.3	2723	2744
محل الإقامة			
المحافظات الحضرية	14.6	2989	3007
وجه بحري	45.2	9266	7986
حضر	11.3	2308	2103
ريف	34.0	6958	5883
وجه قبلي	39.1	8000	8399
حضر	11.5	2346	2276
ريف	27.6	5655	6123
محافظات الحدود ⁽¹⁾	1.1	226	1089
الإجمالي	100.0	20481	20481

⁽¹⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.



الإنجاب

معدل الإنجاب الكلي:




تشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن معدل الإنجاب الكلي (لفترة الثلاث سنوات السابقة على إجراء المسح) قد وصل إلى 2.85 طفل لكل سيدة والذي يمثل انخفاضاً عن المستوى الذي تم رصده في سنة 2014 بحوالي 0.7 طفل (بلغ المعدل 3.5 طفل لكل سيدة في المسح السكاني الصحي 2014). ويلاحظ انخفاض معدلات الإنجاب التفصيلية بصفة عامة لجميع فئات العمر للسيدات.

معدلات الإنجاب طبقاً لمحل الإقامة:


تشير النتائج إلى تفاوت معدلات الإنجاب الكلية بصورة واضحة بين المناطق المختلفة، بحيث انخفض المعدل بشكل كبير في المحافظات الحضرية ليصل إلى أقل قيمة وهو 2.2 طفل لكل سيدة، بينما يصل المعدل إلى أعلى قيمة في محافظات الحدود والوجه القبلي (3.4 و 3.3 طفل لكل سيدة على الترتيب).

وقد أظهرت النتائج أن معدلات الإنجاب انخفضت في الوجه البحري لتصل إلى 2.7 طفل فقط لكل سيدة. وقد تم ملاحظة أكبر انخفاض في معدل الإنجاب في ريف الوجه البحري حيث وصل إلى 2.8 طفل لكل سيدة، وهو تقريباً 0.8 طفل أقل مما تم رصده في المسح السكاني الصحي –مصر 2014. ويصل معدل الإنجاب العام ٩٦ مولود لكل 1000 سيدة في العمر 15 – 44 ، بينما وصل معدل المواليد الخام إلى 21 مولود لكل ألف من السكان مقابل 29.1 مولود في عام 2014.



معدلات الإنجاب طبقاً للحالة التعليمية:

يختلف معدل الإنجاب الكلى حسب الحالة التعليمية، حيث يصل إلى 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، ويرتفع ليصل إلى 3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي، كما نلاحظ التحسن الواضح عن مسح 2014.



تفضيلات الإنجاب:

كما هو متوقع، توضح البيانات أن الرغبة في الإنجاب ترتبط بقوة بعدد الأطفال الأحياء لدى السيدة بالفعل. فقد وجد أن 85% من السيدات اللاتي لم يبدأن الإنجاب وقت إجراء المسح يرغبن في إنجاب طفل بسرعة. ومن بين السيدات اللاتي لديهن طفل واحد، فإن أقل قليلاً من تسعة من بين كل عشرة أبدين الرغبة في إنجاب طفل آخر. وبين السيدات اللاتي لديهن أكثر من طفل، فإن الرغبة في عدم إنجاب المزيد من الأطفال تزيد بسرعة مع زيادة عدد الأطفال من 55% بين السيدات اللاتي لديهن طفلين إلى 82% بين السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال.

جدول (3): تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفي العمر 15-49 سنة
حسب الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال، حسب عدد الأطفال الأحياء، مصر 2021

الإجمالي	عدد الأطفال الأحياء ⁽¹⁾							الرغبة في مزيد من الأطفال
	+6	5	4	3	2	1	صفر	
12.9	0.9	2.1	3.0	5.2	14.7	43.0	85.1	تريد طفلاً حالياً ⁽²⁾
11.2	0.3	1.9	2.2	5.3	18.8	43.9	3.5	تريد طفلاً بعد فترة ⁽³⁾
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	تريد طفلاً ولم تحدد الوقت
4.4	1.2	2.4	2.6	4.5	8.3	2.0	1.3	لم تقرر
66.3	84.4	84.3	85.0	81.5	55.2	8.2	0.2	لا تريد أطفالاً آخرين
2.0	9.5	6.3	3.7	1.0	0.1	0.0	0.2	أجرت عملية تعقيم
3.1	3.6	3.0	3.6	2.5	2.9	2.9	9.6	لا يمكن أن تحمل
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	بيانات مفقودة
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي
19018	1018	1558	3628	5752	4501	1898	663	العدد


(1) عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي.

(2) ترغب في إنجاب الطفل التالي خلال سنتين.

(3) ترغب في تأجيل الطفل التالي لمدة سنتين أو أكثر.


الإنجاب غير المرغوب:

تشير بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن حوالي 20% من المواليد خلال الخمس سنوات السابقة على المسح لم يكن مرغوباً فيهم وقت الحمل. ومن بين المواليد غير المرغوب فيهم وقت الحمل حوالي 12% لم يكن مرغوب فيهم على الإطلاق، وهي نسبة أعلى مما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي 2014، حيث كان 8% من المواليد غير مرغوب فيهم على الإطلاق.




تنظيم الأسرة

الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة:




تشير النتائج وفقاً لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن ثلثي السيدات المتزوجات حالياً في العمر من 15-49 يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة بزيادة حوالي 8 نقاط عن المستوى الذي تم رصده في المسح السكاني الصحي 2014، وكما هو موضح بالشكل. وتصل نسبة مستخدمي الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة في 2021 إلى 65 %، مقارنة بحوالي 57 % في 2014، بينما تصل نسبة استخدام الوسائل التقليدية إلى أقل من 2 % في كل من المسحين.

وتصل نسبة مستخدمي اللولب إلى 29 %، بينما 20 % يستخدمون الحبوب، في حين تصل نسبة مستخدمي الحقن إلى 10 %. وبالمقارنة مع بيانات مسح 2014، يلاحظ ارتفاع نسبة استخدام الحبوب بحوالي 4 نقاط (16 % في مسح 2014) بينما تراجع استخدام اللولب بحوالي نقطة واحدة. وترتفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في 2021 في الحضر مقارنة بالريف بحوالي ثلاث نقاط، مع وجود اختلافات حسب محل الإقامة، حيث تصل نسب الاستخدام إلى حوالي 71 % في المحافظات الحضرية والوجه البحري، بينما تصل هذه النسبة في الوجه القبلي إلى 59 % فقط.



وترتفع معدلات الاستخدام مع العمر من حوالي 39 % فقط بين السيدات في العمر من 15-19 إلى 75 % بين السيدات في العمر من 35-44. وحسب التعليم، تتراوح نسب الاستخدام من 62 % بين اللاتي أتممن التعليم الابتدائي/بعض الثانوي إلى 68 % بين الحاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى. وترتفع نسب الاستخدام كذلك مع عدد الأطفال لدى السيدة، حيث تصل النسبة إلى 77 % بين من لديهن 3-4 أطفال، وتقل قليلاً إلى 74 % بين من لديهن 5 أطفال فأكثر. أيضاً ترتفع نسبة الاستخدام بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدي لتصل إلى 71 %، مقابل 66 % بين اللاتي لا يعملن مقابل عائد نقدي.



مصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة:


يعتبر القطاع الحكومي هو المصدر الرئيسي لوسائل تنظيم الأسرة، حيث نجد أن حوالي 62.5% من السيدات المستخدمات يحصلن على الوسيلة من القطاع الحكومي والغالبية من وحدة صحية ريفية (38%). وتحصل 37% من السيدات المستخدمات حالياً على الوسيلة من القطاع الخاص (17% من الصيدلية، 20% من عيادة/مستشفى / طبيب خاص) ويحصل 0.2% من المستخدمات حالياً على الوسيلة من الجمعيات الأهلية.

جدول (4): مصادر الحصول على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة						
التوزيع النسبي للمستخدمات حالياً للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة حسب أحدث مصدر وحسب وسائل محددة، مصر 2021						
المصدر	حبوب	لولب	حقن	كبسولات تحت الجلد	تعقيم المرأة	الإجمالي ⁽¹⁾
قطاع حكومي	54.0	62.8	83.3	95.4	17.3	62.5
قطاع طبي خاص	45.7	36.4	16.5	4.4	81.8	37.1
غير طبي / خاص	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
أخرى / غير مبين	0.2	0.8	0.0	0.2	0.9	0.3
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات المستخدمات حالياً	3747	5264	1902	506	355	11442
(1) تشمل استخدام الواقي الذكري والوسائل الموضعية (حاجز مهبلي/أقراص فوارة/كريم) والتي ليس لها توزيع منفصل.						

الحاجة غير الملابة لتنظيم الأسرة:

تعرف الحاجة غير الملابة لتنظيم الأسرة على أنها نسبة السيدات اللاتي يرغبن في تأجيل المولود التالي أو لا يرغبن في المزيد من الأطفال، ولكن لا يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة. وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن حوالي 14 % من السيدات المتزوجات حالياً لديهن حاجة غير ملابة لتنظيم الأسرة، 4 % للمباعدة بين المواليد و 10 % للتوقف عن الإنجاب. ويلاحظ زيادة الحاجة غير الملابة بشكل طفيف (حوالي 1.2 %) بين عامي 2014 و 2021 سواء للمباعدة بين المواليد أو لتحديد الإنجاب.

وتزيد الحاجة غير الملابة بشكل أكبر في الوجه القبلي (17 %)، وخصوصاً الريف (18 %) مع عدم وجود اختلافات ملحوظة مقارنة بمسح 2014. وتشير البيانات كذلك إلى ارتفاع إجمالي الطلب على تنظيم الأسرة إلى حوالي 80 % وهو أعلى بحوالي 9 نقاط مقارنة بالمسح السكاني الصحي 2014.




وفيات الأطفال

معدلات وفيات الطفولة المبكرة:

تشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن معدل وفيات الأطفال الرضع خلال الخمس سنوات السابقة على المسح بلغ 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 18 حالة لكل 1000 مولود، بينما وصل معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة (بعد الشهر الأول) إلى 7 حالات لكل 1000 مولود حي. وقد وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 28 حالة لكل 1000 مولود حي. وتمثل وفيات الرضع حوالي 89 % من وفيات الأطفال في مصر، وحوالي 72 % من وفيات الرضع تحدث خلال الشهر الأول بعد الولادة.

وتشير بيانات المسح مقارنة بالمعدلات التي تم رصدها في المسح السكاني الصحي 2014 إلى حدوث ارتفاع في معدل وفيات الرضع من 22 حالة وفاة لكل 1000 مولود في 2014 إلى 25 حالة وفاة في 2021، وكذا معدلات وفيات الأطفال خلال الشهر الأول من 14 حالة لكل 1000 مولود في 2014 إلى 18 حالة في 2021، بينما انخفض معدل وفيات الأطفال من 4-1 سنوات من 5 حالات لكل 1000 مولود إلى 3 حالات فقط.



التباينات في معدلات وفيات الطفولة المبكرة:


وتشير البيانات المعروضة في جدول (5) إلى التباينات في معدلات الوفيات وفقاً لمحل الإقامة. ونظراً لانخفاض وفيات الأطفال فقد تم حساب معدلات الوفيات لفترة العشر سنوات السابقة على المسح. وتشير البيانات إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة في الريف (31 حالة لكل 1000 مولود) مقارنة بالحضر (24 حالة لكل 1000 مولود). وبالنسبة لمحل الإقامة، فإن معدلات وفيات الأطفال أعلى في الوجه القبلي مقارنة بالمحافظات الحضرية والوجه البحري. ويلاحظ أن معدلات الوفيات أقل في محافظات الحدود، ولكن يجب أن تؤخذ هذه النتيجة بشيء من الحذر، حيث يمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى انخفاض حجم العينة في هذه المحافظات.

جدول (5): معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب الإقامة					
معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال ووفيات الأطفال دون الخامسة في فترة العشر سنوات السابقة على المسح حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مصر 2021					
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية	وفيات حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولادة ⁽¹⁾	وفيات الرضع	وفيات الأطفال (4-1 سنة)	وفيات الأطفال دون الخامسة
الإقامة					
حضر	15	7	22	2	24
ريف	18	9	27	4	31
محل الإقامة					
المحافظات الحضرية	13	6	19	2	21
وجه بحري	14	7	21	2	23
حضر	14	5	19	1	20
ريف	14	7	21	3	24
وجه قبلي	21	11	32	5	37
حضر	18	9	27	4	31
ريف	21	12	33	6	39
محافظات الحدود ⁽²⁾	10	4	14	3	17
⁽¹⁾ يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثي الولادة.					
⁽²⁾ لا تتضمن محافظة شمال سيناء.					

رعاية الحمل

مؤشرات رعاية الحمل:

تعتبر الرعاية أثناء الحمل والولادة ذات أهمية كبيرة لصحة الأم والطفل. وقد أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن الغالبية العظمى من السيدات في العمر من 15 - 49 قد حصلن على رعاية خلال حملهن في المولود الأخير من مقدم خدمة مدرب (97 %)، وحوالي 90 % حصلن على رعاية حمل منتظمة؛ أي حصلن على رعاية للحمل على الأقل 4 مرات، وهو تحسن واضح بالنسبة لما تم رصده في 2014 حيث كانت نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية منتظمة للحمل 83 %.



ولا توجد تفاوتات واضحة في مؤشرات رعاية الحمل بين الحضر والريف، أو حسب محل الإقامة، وإن كانت رعاية الحمل أعلى في الوجه البحري مقارنة بالمناطق الأخرى (93 % حصلن على رعاية حمل منتظمة في الوجه البحري). وتوجد تفاوتات في حصول السيدات على رعاية الحمل المنتظمة حسب الحالة التعليمية، حيث تزداد نسبة الحصول على رعاية حمل منتظمة مع ارتفاع المستوى التعليمي للسيدة، فقد وصلت النسبة إلى 93 % بين السيدات اللاتي أتممن تعليم ثانوي فأكثر مقابل 82 % فقط بين السيدات اللاتي لم يلتحقن بالتعليم.


وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن حوالي 70 % من السيدات (15-49) حصلن على الأقل على حقنة تيتانوس واحدة، كما أن 49 % من الأمهات حصل أطفالهن على حماية من التيتانوس الوليدي، وتقل هذه النسب عما أظهرته نتائج مسح 2014 كما هو واضح من الشكل.

المساعدة الطبية أثناء الولادة:

وقد لوحظ زيادة نسبة الولادات التي تمت على يد مقدم خدمة طبية وفي منشأة صحية، حيث وجد أن 97% من الولادات خلال الخمس سنوات السابقة على المسح قد تمت على يد مقدم خدمة طبية، وأن حوالي 95% من الولادات قد تمت في منشأة صحية، وهو يمثل زيادة عما تم ملاحظته في 2014.

الولادات القيصرية:

أما بالنسبة للولادات القيصرية فقد لوحظت زيادة كبيرة بها، حيث تشير النتائج إلى أن تقريباً ثلاث من بين كل أربع سيدات (72%) تمت ولادة طفلهن الأخير بولادة قيصرية. ويتضح من النتائج ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بصورة واضحة عن المستوى الذي تم رصده في 2014 حيث كانت النسبة 52% من الولادات.



التباينات في مؤشرات رعاية الحمل والولادة:

وبالنظر إلى مؤشرات رعاية الحمل والولادة حسب المحافظات المختلفة، نجد أن هناك تفاوتات بين المحافظات المختلفة. وقد أظهرت محافظتا الإسكندرية ودمياط أعلى نسب لرعاية الحمل المنتظمة (حوالي 97% و 96%)، على الترتيب مع حدوث جميع الولادات في محافظه دمياط على يد مقدم خدمة طبية، والذي ارتبط أيضاً بنسبة مرتفعة للغاية من الولادات القيصرية (82.5%). وقد تمت ملاحظة ارتفاع نسب الولادات القيصرية عن المتوسط في العديد من المحافظات، منها بورسعيد (91.3%)، كفر الشيخ (88.4%) والغربية (84.3%). وتصل نسبة الولادات القيصرية أقل ما يمكن في محافظة مطروح (39.3%).


التطعيمات وصحة الطفل

تسجيل المواليد:

يعتبر تسجيل المواليد أمراً بالغ الأهمية، وذلك لضمان حصول الطفل على كافة حقوقه، نظراً لأهمية التسجيل للحصول على التطعيمات، وللالتحاق بالتعليم، وكذلك في البحث عن عمل والزواج فيما بعد. وأظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن تسجيل المواليد يصل إلى 99 %، ولا تختلف النسبة كثيراً حسب المناطق الجغرافية المختلفة أو جنس المولود.

التطعيمات:

وقد تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 جمع بيانات عن التطعيمات التي حصل عليها الأطفال المصريون وفقاً للإرشادات الموصى بها. وقد تم الحصول على البيانات بالاطلاع على وثيقة (شهادة ميلاد أو بطاقة صحية) مسجل بها التطعيمات، وفي حالة عدم الاطلاع على شهادة الميلاد (أو البطاقة الصحية) تم سؤال الأم مجموعة من الأسئلة لتحديد ما إذا كان الطفل قد حصل على كل تطعيم. وقد وجد أن تطعيم الحصبة (MMR) لا يتم إعطاؤه في مصر قبل سن سنة (12 شهراً) ولذلك يتم حساب مدى انتشار التطعيمات للأطفال في العمر 18 – 29 شهراً.




وتشير البيانات إلى أنه تم الاطلاع على وثيقة مسجل بها التطعيمات في 68 % من الحالات، أي أن حوالي 32 % قد تم الحصول على البيانات الخاصة بالتطعيمات من الأم.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 90 % من الأطفال في العمر 18-29 شهراً قد حصلوا على كل التطعيمات الأساسية (3 جرعات من التطعيم الخماسي، 3 جرعات من شلل الأطفال، وجرعة من MMR) مقارنة بـ 92 % في المسح السكاني الصحي 2014. وتشير البيانات في الشكل إلى

أن هناك ارتفاعاً في نسبة الأطفال الذين حصلوا على كل التطعيمات الأساسية في الوجه القبلي في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 مقارنة بالمستوى الملاحظ في 2014، بينما انخفضت النسبة في المحافظات الحضرية بصورة ملحوظة، ولم تتغير النسبة في الوجه البحري بين 2014 و2021.

ويلاحظ ارتفاع نسبة الأطفال الذين حصلوا على جميع التطعيمات الأساسية في الريف عن الحضر (92 % مقابل 86 % على الترتيب). وتوجد اختلافات محدودة حسب الحالة التعليمية للأم والحالة العملية لها.



جدول (6): التطعيمات حسب الخصائص الخلفية

نسبة الأطفال في العمر 18-29 شهراً الذين تمت رؤية تطعيماتهم المسجلة ونسبة الذين تلقوا تطعيمات محددة في وقت المسح (حسب وثيقة التطعيم أو ما ذكرته الأم)، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

الخصائص الخلفية	تم الاطلاع على وثيقة التطعيم	الدرن			الخماسي ^(١)			شلل الأطفال				الحصبة	كل التطعيمات ⁽³⁾	لا يوجد تطعيمات	عدد الأطفال
		١	2	3	تتشبكية	١	2	3	١	2	3				
النوع															
ذكر	70.0	98.9	98.7	96.7	95.9	65.2	98.5	96.8	95.4	94.3	96.8	91.6	1.0	1292	
أنثى	66.1	99.5	99.4	96.4	93.8	60.0	99.2	96.7	95.5	93.9	95.4	88.1	0.4	1237	
الإقامة															
حضر	61.7	98.8	98.9	95.1	92.3	56.2	98.7	97.1	94.9	92.9	93.8	85.6	1.1	895	
ريف	71.6	99.5	99.1	97.4	96.3	66.1	99.0	96.5	95.7	94.7	97.4	92.2	0.5	1634	
محل الإقامة															
المحافظات الحضرية	57.6	97.2	97.6	93.3	88.7	51.5	97.2	96.2	94.5	91.9	90.8	80.3	2.4	296	
وجه بحري	69.3	99.2	99.0	96.5	96.1	63.3	98.6	96.7	96.2	95.6	97.1	93.2	0.8	847	
حضر	62.9	99.5	99.5	95.9	95.9	57.0	99.5	96.1	94.6	94.6	97.4	92.4	0.5	222	
ريف	71.6	99.1	98.9	96.8	96.2	65.5	98.3	96.9	96.7	95.9	97.0	93.5	0.9	625	
وجه قبلي	69.9	99.9	99.5	97.5	95.5	64.9	99.6	97.0	95.1	93.4	96.7	89.5	0.0	1237	
حضر	64.6	100.0	100.0	96.3	92.9	60.1	99.7	99.3	96.0	92.6	93.7	84.8	0.0	277	

تابع جدول (6): التطعيمات حسب الخصائص الخلفية

	960	149
رقف	0.0	1.6
مضافات الحدود ⁽⁴⁾	91.0	92.4
	97.7	96.3
	93.6	93.8
	94.8	96.1
	99.6	97.7
	66.5	67.0
	96.4	95.4
	97.9	97.6
	99.3	98.4
	99.8	97.7
	71.6	68.8

الحالة التعليمية

245	1.4	86.9	94.1	94.1	95.9	96.3	98.0	60.0	92.7	96.2	98.6	98.6	65.7	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
121	0.4	84.1	90.1	90.6	91.2	94.8	98.2	55.0	91.6	91.6	98.8	99.6	62.1	لم تتم المرحلة الابتدائية
630	0.5	90.0	96.4	93.6	94.9	96.2	98.5	65.2	94.5	96.0	98.9	99.1	72.1	أنمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
1533	0.6	90.8	96.9	94.6	96.0	97.3	99.2	62.6	95.7	97.3	99.2	99.4	67.3	أنمت المرحلة الثانوي / فأعلى

الحالة العملية

230	1.1	89.0	96.7	94.8	98.4	98.4	98.9	56.5	93.4	97.1	98.9	98.9	58.9	تعمل مقابل عائد مادي
2299	0.6	89.9	96.0	94.0	95.1	96.6	98.9	63.2	95.0	96.5	99.1	99.3	69.0	لا تعمل مقابل عائد مادي
2529	0.7	89.9	96.1	94.1	95.4	96.8	98.9	62.6	94.9	96.6	99.1	99.2	68.1	لا يعمل مادي

شَلُّ الأَطْفَالِ صَفَر: هو تطعيم شَلُّ الأَطْفَال الذي يعطى للطفل عند الولادة؛ الخماسي - الخماسي التثبيطي، شَلُّ الأَطْفَال التثبيطي؛ طعمهم الحمضية أو الحمضية الألمانية / الغدة الدرقية.

(١) الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الثلاثي يشمل الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الخماسي.

(2) متاحة فقط في البيانات التي تم جمعها من وثيقة التجميع.

(3) يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرن، طعم الحصبة أو الحصبة الألمانية الألماني / الغدة النكافية، ثلاث جرعات من الطعم الثلاثي وثلاث جرعات من طعم السشل.

(4) لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

الرضاعة الطبيعية:

تعتبر الرضاعة الطبيعية المطلقة شائعة، ولكن ليست عامة في الطفولة المبكرة في مصر، حيث وجد أن حوالي 58% من الأطفال أقل من شهرين يتناولون لبن الثدي فقط، وهي أقل كثيراً من النسبة التي تم ملاحظتها في المسح السكاني الصحي 2014 (71%)، وتنخفض هذه النسبة إلى 45% بين الأطفال في العمر من 4-5 شهور، وهي أعلى قليلاً من النسبة التي تمت ملاحظتها في 2014 بحوالي 2%.

وتشير البيانات إلى أن الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال أقل من 6 أشهر تبلغ 40%، وهو تقريباً المستوى نفسه الذي تمت ملاحظته في المسح السكاني الصحي 2014. وتشير البيانات إلى أن غالبية الأطفال، وكما توصي منظمة الصحة العالمية، عند عمر 6 أشهر أو أكبر يتلقون أغذية أخرى أو لبن خارجياً بالإضافة إلى لبن الأم. فنجد أن حوالي ثلثي الأطفال (66%) في العمر 6-9 أشهر يحصلون على أغذية مكملية مع لبن الأم، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 78% عند العمر 12-15 شهراً.

جدول (7): حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر

التوزيع النسبي لأصغر الأطفال أقل من سنتين، ويعيشون مع أمهاتهم حسب حالة الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين يرضعون حالياً ونسبة جميع الأطفال الأقل من سنتين ويستخدمون زجاجة بخلمة، حسب عمر الطفل بالأشهر، مصر 2021

العمر بالأشهر	لا يرضع طبيعياً	حالة الرضاعة الطبيعية					النسبة الذين يرضعون حالياً	عدد أصغر الأطفال الأقل من سنتين	نسبة الذين يستخدمون زجاجة بخلمة	عدد الأطفال الأقل من سنتين
		رضاعة طبيعية مطلقة	رضاعة طبيعية مع ماء فقط	رضاعة طبيعية مع سوائل/عصير ⁽¹⁾	رضاعة طبيعية مع لبن آخر	رضاعة طبيعية مع أغذية مكملية				
1-0	1.7	57.8	7.7	3.1	19.5	10.1	98.3	287	36.0	287
2-3	5.1	45.0	11.4	5.4	25.9	7.1	94.9	395	42.6	404
4-5	7.0	20.7	18.9	4.6	16.9	31.8	93.0	354	39.9	357
6-8	8.9	6.4	13.3	3.1	5.8	62.6	91.1	487	36.8	509
11-9	6.3	2.0	6.3	1.5	3.0	81.0	93.7	498	25.9	512
17-12	21.8	0.9	1.9	1.2	0.5	73.7	78.2	1188	23.0	1,219
23-18	65.3	0.4	0.6	0.0	0.3	33.4	34.7	1113	12.8	1,108
3-0	3.7	50.4	9.9	4.4	23.2	8.4	96.3	681	39.9	691

تابع جدول (7): حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر


العمر بالأشهر	لا يرضع طبيعياً	حالة الرضاعة الطبيعية					الإجمالي	نسبة الذين يرضعون حالياً	عدد أصغر الأطفال الأقل من سنتين ويعيشون مع أمهاتهم	نسبة الذين يستخدمون زجاجة بلمة من سنتين	عدد الأطفال الأقل من سنتين
		رضاعة طبيعية مطلقة	رضاعة طبيعية مع ماء فقط	رضاعة طبيعية مع سوائل/ عصير ⁽¹⁾	رضاعة طبيعية مع لبن آخر	رضاعة طبيعية مع أغذية مكملة					
5-0	4.8	40.2	13.0	4.5	21.1	16.4	100.0	95.2	1035	39.9	1,048
9-6	8.9	5.5	11.8	2.8	5.5	65.5	100.0	91.1	639	34.1	657
15-12	16.6	1.3	2.2	1.3	0.7	77.8	100.0	83.4	790	25.1	814
23-12	42.8	0.6	1.3	0.6	0.4	54.2	100.0	57.2	2301	18.1	2327
23-20	73.8	0.3	0.2	0.0	0.0	25.7	100.0	26.2	729	9.0	727

ملاحظة: تشير حالة الرضاعة الطبيعية إلى "24 ساعة" (اليوم السابق والليلة السابقة). والأطفال الذين تم تصنيفهم على أساس أنهم يرضعون ويشربون الماء فقط لا يقومون بأخذ أي أغذية مكملة. وتعتبر فئات لا يرضع طبيعياً، رضاعة طبيعية مطلقة، رضاعة طبيعية مع ماء فقط، سوائل، لبن آخر، والأغذية المكملة (ناشف أو شبه ناشف) ذات طابع هرمي ومتعلقة ببعضها، والنسب الخاصة بهم تعطى إجمالاً 100٪. لذا فإن الأطفال الذين تلقوا لبن الأم وسوائل ولم يتلقوا لبن آخر ولم يتلقوا أغذية مكملة يتم تصنيفهم في فئة رضاعة طبيعية مع سوائل حتى وإن تلقوا ماء فقط. وأي أطفال حصلوا على أغذية مكملة يتم تصنيفهم في هذه الفئة طالما أنهم يرضعون بصورة جيدة.

(1) تتضمن السوائل العصير، مشروبات عصير، شوربة، أو أي سوائل أخرى.


إسهال الأطفال:

توضح بيانات المسح أن نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال في أي وقت خلال فترة الأسبوعين السابقين على المسح بلغت 12٪، وتزداد نسبة الأطفال في العمر 6-11 الذين أصيبوا بالإسهال لتصل إلى 23٪. وقد تم استشارة مقدم خدمة طبية في 84٪ من حالات الإسهال، وكانت الغالبية العظمى من الاستشارات عن طريق مقدم خدمة خاص (77٪). بالإضافة إلى ذلك، تم علاج الأطفال باستخدام محلول معالجة الجفاف (40٪) أو محلول معد بالمنزل (4٪). وتشير النتائج إلى عدم وجود اختلافات واضحة حسب النوع أو بين الحضر والريف، بينما توجد بعض الاختلافات حسب العمر ومحل الإقامة والحالة التعليمية وإن كانت اختلافات محدودة.




أمراض الجهاز التنفسي الحادة:

وتوضح البيانات أن نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي قد بلغت 11 % خلال الأسبوعين السابقين للمسح. ولا توجد اختلافات كبيرة، مثل حالة الإسهال، حسب العمر مع ارتفاع نسبة المصابين كما هو الحال في حالة الإسهال بين الأطفال في العمر من 6-11 شهراً؛ حيث تصل النسبة إلى 16,6 %. وتشير النتائج إلى ارتفاع نسبة انتشار أمراض الجهاز التنفسي الحادة في الريف عن الحضر. وتقل نسبة من قاموا باستشارة مقدم خدمة طبية عما تم رصده بالنسبة للإسهال، حيث تم استشارة حوالي 62 % فقط من حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، والغالبية قامت باستشارة مقدم خدمة طبية خاص. وقد تم إعطاء الطفل مضاد حيوي في أكثر من نصف الحالات (57,4 %) مع عدم وجود اختلافات حسب الخصائص المختلفة.




الحالة التغذوية:



الحالة التغذوية للأطفال هي المحدد الأساسي لصحتهم ونموهم. وقد تم من خلال المسح قياسات الوزن والطول للأطفال الصغار أقل من خمس سنوات في مصر. وقد تم قياس الوزن والطول لجميع الأطفال في 75 % من الأسر المعيشية، وقد كانت قياسات الوزن والطول كاملة ومقبولة لعدد

9694 طفلاً. وتشير النتائج إلى تحسن واضح في مؤشرات الحالة التغذوية للأطفال. فكما يتضح من الشكل انخفاض نسبة الأطفال المصابين بقصر القامة (التقزم) من 21 % في عام 2014 إلى

13% وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، مع انخفاض نسبة المصابين بالانحافة من 8% في 2014 إلى 3% في 2021. أما بالنسبة لمؤشر نقص الوزن فقد انخفض من 6% إلى 3.7% في 2021. وتشير نتائج المسح إلى وجود بعض الاختلافات حسب المناطق الجغرافية المختلفة، حيث ترتفع نسبة قصر القامة بالنسبة للعمر في ريف الوجه القبلي لتصل إلى 16%، وتنخفض في حضر الوجه البحري إلى أقل من 10%.



ومن النتائج المشجعة أيضاً، انخفاض نسبة الأطفال الذين لديهم وزن زائد، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 12%، ثلاث نقاط أقل مما هو مسجل في المسح السكاني الصحي 2014 (15%). وتنخفض نسبة الأطفال زائدي الوزن في الوجه القبلي إلى 9% مقابل 15% في الوجه البحري. وتصل نسبة الأطفال الذين لديهم وزن زائد إلى 19% بين الأطفال في حضر الوجه البحري.

وبالرغم من تحسن المؤشرات الجسمانية إلا أن البيانات تشير إلى ارتفاع نسبة المصابين بالأنيميا بين 2014 و 2021، حيث ارتفعت النسبة بين الأطفال من عمر 6-59 شهراً من 27.2% إلى 43%. وتصل نسبة الأنيميا البسيطة إلى 20% مقارنة بحوالي 18% عام 2014، وكانت الزيادة الواضحة في نسبة المصابين بالأنيميا متوسطة، حيث بلغت النسبة حوالي 21% أكثر من ضعف النسبة التي تم ملاحظتها في 2014 (10%). وتوجد تفاوتات محدودة حسب الحضر والريف وحسب محل الإقامة، وكذلك بين الإناث والذكور.


جدول (8): انتشار الأنيميا بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً

نسبة الأطفال في العمر 6-59 شهراً الذين تم تصنيفهم كمصابين بالأنيميا،
حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

حالة الأنيميا حسب مستوى الهيموجلوبين في الدم

الخصائص الخلفية العمر بالأشهر	أي أنيميا (>11 جم/ديسيلتر)	بسيطة ($10,0-10,9$ جم/ديسيلتر)	متوسطة ($7,0-9,9$ جم/ديسيلتر)	حاددة ($>7,0$ جم/ديسيلتر)	عدد الأطفال
6 - 8	64.8	26.0	37.7	1.1	195
9 - 11	67.3	27.3	39.7	0.2	231
12 - 17	60.8	21.6	37.7	1.5	588
18 - 23	50.1	21.5	26.9	1.7	548
24 - 35	43.8	23.1	19.6	1.1	1162
36 - 47	37.3	21.6	14.3	1.3	1265
48 - 59	29.7	15.7	12.3	1.7	1343
النوع					
ذكر	43.5	20.6	21.3	1.6	2721
أنثى	42.5	21.1	20.2	1.2	2613
الإجمالي	43.0	20.9	20.8	1.4	5334

ملاحظة: الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية والذين تم إجراء اختبار الأنيميا لهم. يعتمد انتشار الأنيميا على مستويات الهيموجلوبين في الدم والمعدل للارتفاع. تم قياس الهيموجلوبين بالجرامات لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر).



العنف ضد المرأة



إن العنف من الظواهر التي تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، والتي لها آثار سلبية على المجتمع وخصوصاً الفئات المستضعفة. وللعنف أوجه كثيرة منها العنف الأسري وخصوصاً ضد المرأة، والتحرش، وكذلك الزواج المبكر للفتيات، بالإضافة إلى ختان الإناث. وقد تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 دراسة ظاهرة ختان الإناث ومدى تعرض السيدات للعنف داخل المنزل وخاصة من الزوج، وفيما يلي عرض لأهم هذه النتائج.

ختان الإناث:

يعتبر ختان الإناث من العادات المنتشرة بصورة كبيرة في مصر، وبالرغم من الجهود المبذولة منذ التسعينيات إلا أن المؤشرات ما زالت تدل على استمرار هذه الظاهرة مع انخفاض نسبة الختان بشكل بطيء بين السيدات وانخفاضها بشكل أكبر وأسرع بين الفتيات.

الختان بين السيدات:

توضح البيانات انخفاض نسبة الختان بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لتصل إلى حوالي 86% مقابل 92% في 2014. وترتفع نسبة الختان في الريف عن الحضر بأكثر من 10 نقاط مئوية (90% مقابل 79% على الترتيب). كما تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة الختان في الوجه القبلي (92%) مقارنة بالمحافظات الحضرية والوجه البحري.



وترتبط نسبة الختان بالحالة التعليمية للسيدات، حيث تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان مع ارتفاع المستوى التعليمي لتصل النسبة إلى 82% بين السيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى وهو أقل بـ 13 نقطة مئوية عن النسبة بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة (95%).

الختان بين البنات:


تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان بين البنات 0-19 عنها بين السيدات، حيث وصلت نسبة الختان بين البنات من 0-19 إلى 14 %، حوالي 8 نقاط أقل من المستوى المسجل في 2014، كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل إلى 13 % فقط مقارنة بحوالي 35 % في عام 2014. وتشير البيانات إلى أن النسبة المتوقعة لختان البنات سوف تصل إلى 27 % فقط وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.

وتظهر النتائج أن ختان البنات 0-19 يتم في الغالب على يد طبيب، حيث نجد أن حوالي 74 % من حالات الختان تمت على يد طبيب، بالإضافة إلى حوالي 10 % تمت على يد ممرضة، ويسود هذا النمط في جميع المناطق الجغرافية.

جدول (9): نسب انتشار وتوقع ختان الإناث بين البنات


نسبة البنات في العمر 0-19 واللاتي تم ختانهن، ونسبة اللاتي لم يتم ختانهن، ولكن لدى أمهاتهن نية لختانهن في المستقبل، ونسبة المتوقع ختانهن بالأخذ في الاعتبار حالة الختان الحالية ونية الأم، حسب العمر الحالي للبنات، مصر 2021

العمر الحالي للبنات	نسبة المختنات	نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل	النسبة المتوقع ختانهن	عدد البنات
0 - 2	0.4	20.4	20.8	3489
3 - 4	1.7	19.9	21.6	2686
5 - 6	3.0	20.1	23.1	2979
7 - 8	5.1	15.4	20.5	2966
9 - 10	9.4	13.8	23.3	2787
11 - 12	17.4	9.7	27.1	2586
13 - 14	27.5	4.3	31.8	2344
15 - 17	36.8	2.1	38.9	2775
18 - 19	45.8	1.1	46.8	1570
الإجمالي	14.2	12.8	27.0	24182



العنف داخل المنزل:

تشير النتائج إلى أن حوالي ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج خلال الـ 12 شهراً السابقة على المقابلة. وبالنظر إلى نسب التعرض للعنف حسب نوع العنف المرتكب يتبين أن السيدات يتعرضن للعنف الجسدي أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف. ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج قد سبق لهن التعرض للعنف الجسدي، وحوالي 6% تعرضن للعنف الجنسي، و22% تعرضن للعنف النفسي. وبصفة عامة فإن 31% من السيدات سبق لهن التعرض لأي شكل من أشكال العنف سواء النفسي أو الجسدي أو الجنسي.




عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل

عمالة الأطفال:

تشير النتائج إلى أن حوالي 6% من الأطفال في العمر 5-17 سنة قد اشتركوا في عمالة الأطفال، أي القيام بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية لمدة تزيد عن الحد المناسب لهم بالنسبة لعمرهم و/أو قد عملوا في ظروف خطيرة. ومن ناحية أخرى فقد اشترك 5% من الأطفال في العمر من 5-17 سنة في أنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية مناسبة لسنهم.

وتتفاوت نسب عمالة الأطفال حسب محل الإقامة، حيث تصل إلى أعلى معدل لها في ريف الوجه القبلي، بينما لوحظ أن أقل نسبة عمالة للأطفال هي بين الأطفال المقيمين في المحافظات الحضرية. ومن الجدير بالذكر أن 3% من الأطفال يعملون في ظروف خطيرة.



الأساليب التربوية:


هناك أساليب مختلفة تم استخدامها لضبط سلوك الأطفال في العمر من 1-14 سنة، خلال الشهر السابق على المسح.

وكانت أكثر الأساليب غير العنيفة التي تم استخدامها هو شرح للطفل لماذا كان سلوكه خطأ (81%). أما فيما يخص الأساليب العنيفة، فكان الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ مع الطفل هو أكثر أسلوب تم اتباعه (75%). كما كان أكثر أساليب العنف الجسدي التي تم استخدامها هو ضرب الطفل على يده أو ذراعه، حيث ذكرت 4 سيدات من كل 10 ضرب الطفل على يديه أو ذراعه أو ساقه كأسلوب لضبط سلوك الطفل خلال الشهر السابق على المسح. وقد ذكرت السيدات بعض أساليب العنف الجسدي الشديد، وكان أكثرها ذكراً "ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الأذنين" (25%).

جدول (10): ضبط سلوك الأطفال	
نسبة الأطفال في العمر 1-14 سنة وفقاً للعدد النظري الذين تم استخدام أحد أساليب ضبط السلوك معهم في الشهر السابق لإجراء المقابلة، مصر 2021	
الأسلوب ضبط السلوك	الإجمالي
أساليب ضبط السلوك غير العنيفة	
حرمان الطفل من شيء يحبه، إبعاد بعض المزايا عنه، أو حرمانه من مغادرة المنزل	39.5
توضيح أن سلوك الطفل كان خطأ	81.2
إعطاء الطفل شيء آخر ليفعله	38.1
أساليب ضبط السلوك العنيفة	
العقاب النفسي	
الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ مع الطفل	74.9
وصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي شيء مُشابه	47.8
العقاب الجسدي	
هز الطفل	32.1
ضرب الطفل على يديه أو ذراعه أو ساقه	39.8
ضرب الطفل على جزئه السفلي باليد فقط	18.9
ضرب الطفل على جزئه السفلي أو أي جزء من جسده بحزام أو فرشاة شعر أو عصا أو أي شيء صلب آخر	14.2
العقاب الجسدي الشديد	
ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الأذنين	25.0
ضرب الطفل بشدة وبتكرارية	5.3
لا يوجد أي أسلوب	8.5
عدد الأطفال	8381

وتشير البيانات إلى أن حوالي 8.5% من الأطفال لم يتم معهم استخدام أي أسلوب لضبط السلوك خلال الشهر السابق على المسح.

وتشير نتائج المسح إلى انخفاض استخدام أساليب التربية العنيفة في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 مقارنة بما تم رصده في المسح السكاني الصحي 2014، مع ارتفاع استخدام أساليب ضبط السلوك غير العنيفة. فقد انخفضت نسبة استخدام أي وسيلة عنيفة لضبط السلوك من 93% في 2014 إلى 81.4% في 2021، وارتفعت نسبة استخدام أساليب التربية غير العنيفة من 4% في 2014 إلى 10.1% في 2021.



الشباب

الخصائص الخلفية للشباب:

تشير البيانات المعروضة في جدول (11) أن أكثر من نصف الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وتمت مقابلتهم في المسح يقل عمرهم عن 20 عاماً (55٪). حوالي ثلث الذين تمت مقابلتهم في العمر 20-24 عام، وحوالي 13٪ فقط يبلغون 25 عاماً أو أكثر. يمثل الذكور 58.6٪ من الشباب الذين تمت مقابلتهم بينما تمثل الإناث 41.4٪. ويرجع السبب في انخفاض نسبة الإناث إلى أن نسبة كبيرة من الإناث تتزوج في عمر أصغر من الشباب الذكور.


جدول (11): الخصائص الخلفية للشباب			
التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي الفئة العمرية 15-29 حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021			
الخصائص الخلفية	النسبة المرححة	العدد المرجح	العدد غير المرجح
العمر			
19-15	54.7	9622	9389
24-20	32.3	5694	5792
29-25	13.0	2287	2422
النوع			
ذكر	58.6	10319	10381
أنثى	41.4	7284	7222
الإقامة			
حضر	45.5	8007	8384
ريف	54.5	9596	9219
محل الإقامة			
المحافظات الحضرية	18.5	3265	3222
وجه بحري	41.4	7281	6276
حضر	12.6	2212	2069
ريف	28.8	5070	4207
وجه قبلي	38.9	6854	7091
حضر	13.5	2385	2353
ريف	25.4	4469	4738
محافظات الحدود ⁽¹⁾	1.1	202	1014
الإجمالي	100.0	17603	17603

⁽¹⁾ لا تتضمن محافظة شمال سيناء

يقطن حوالي 45% من الشباب في الحضر، بينما 55% يقطنون في الريف. ويختلف توزيع الشباب حسب محل الإقامة قليلاً عن توزيع السيدات، حيث يسكن حوالي 19% من الشباب في المحافظات الحضرية، 41% في الوجه البحري، و39% في الوجه القبلي.


اتجاهات الشباب نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة:

أما عن اتجاهات الشباب نحو توقيت استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فتشير النتائج إلى أنه، كما هو الحال بالنسبة للسيدات، ما زالت الغالبية العظمى من الشباب (ذكوراً وإناثاً) يفضلون استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول طفل (70%)، وترتفع هذه النسبة في الحضر عن الريف (71% مقابل 68% على الترتيب). كما أن نسبة الشباب الذين يفضلون استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول طفل ترتفع مع الحالة التعليمية من 56% بين الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة إلى 75% بين الذين أتموا المرحلة الثانوية فأعلى.



رأي الشباب حول العدد الأمثل للأطفال:

وبسؤال الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج عن عدد الأطفال الأمثل، وجد أنه ما زال المتوسط مرتفعاً حيث يصل إلى 2.6 طفل، ويرتفع العدد الأمثل للأطفال بين الشباب الذكور بحوالي 0.3 طفل مقارنة بالإناث (2.7 طفل و2.4 طفل على الترتيب).



أهم المؤشرات

المؤشر	هدف من أهداف التنمية المستدامة	المسح الصحي للأسرة المصرية 2021	المسح السكاني الصحي - مصر 2014
الإنجاب			
معدل الإنجاب الكلى (متوسط عدد المواليد لكل سيدة).		2.85	3.50
معدل الإنجاب لدى المراهقات.	3.7.2	50	56
تنظيم الأسرة			
الاستخدام الحالي لأي وسيلة بين السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 (%).		66.4	58.5
الاستخدام الحالي لأي وسيلة حديثة بين السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 (%).		64.7	56.9
صحة الأمومة والطفولة			
نسبة السيدات الحوامل اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة (4 زيارات فأكثر) من مقدم خدمة مدرب.	3.8.1	89.8	82.8
الولادات في منشأة صحية.		94.8	86.7
المواليد الذين حصلوا على مساعدة طبية أثناء الولادة.	3.1.2	97.1	91.5
الولادات عن طريق الولادة القيصرية.		72.1	51.8
وفيات الطفولة (عدد الوفيات لكل 1000 مولود حي)			
معدل وفيات حديثي الولادة.	3.2.2	18	14
معدل وفيات الرضع.		25	22
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.	3.2.1	28	27
التطعيمات وصحة الطفل			
التغطية بتطعيم الدرن.		99.2	99.1
التغطية بشلل الأطفال جرعة 3.		94.1	96.6
التغطية بتطعيم الحصبة.	3.b.1	96.1	95.8
التغطية بالخماسي جرعة 3 (الثلاثي جرعة 3)		94.1	97.1

المؤشر	هدف من أهداف التنمية المستدامة	المسح الصحي للأسرة المصرية 2021	المسح السكاني الصحي - مصر 2014
الأطفال في العمر 18-29 شهراً الذين تم تطعيمهم بالكامل.		89.9	91.0
الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالإسهال.		84.0	55.3
الحصول على الرعاية الصحية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد.	3.8.1	61.7	68.1
تغذية الأطفال ونمو الطفل			
الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من قصر القامة بالنسبة للعمر (التقزم).	2.2.1	12.8	21.4
الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن بالنسبة للطول.	2.2.2	3.0	8.4
الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن.	2.2.2	11.5	14.9
الأطفال دون الخامسة الذين لديهم أي نوع من الأنيميا.		43	27.2
مؤشر النمو المبكر للطفل.	4.2.1	85.3	—
تسجيل الولادات	16.9.1	99.1	99.4
مؤشرات عنف الأطفال			
التأديب العنيف للأطفال.	16.2.1	81.2	93.0
عمالة الأطفال.	8.7.1	5.6	7.0
العنف ضد المرأة			
أي شكل من أشكال العنف النفسي و/والجسدي و/أو الجنسي		31.0	30.3
العنف النفسي المرتكب من قبل الزوج		22.3	18.8
العنف الجسدي المرتكب من قبل الزوج		25.5	25.2
العنف الجنسي المرتكب من قبل الزوج		5.6	4.1
انتشار ممارسة ختان الإناث بين النساء	5.3.2	85.5	92.3
انتشار ممارسة ختان الإناث بين البنات في العمر من 0-19		14.2	21.4
نسبة الختان المتوقع بين البنات في العمر من 0-19		27.0	56.3

ملحق الجداول

جداول تقرير أهم نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

جدول 1 نتائج مقابلات الأسر المعيشية والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج

أعداد الأسر المعيشية والسيدات المؤهلات اللاتي سبق لهن الزواج، والشباب/الشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 سنة حسب نتيجة المقابلة و نسب الاستجابة بحسب مكان الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة (غير مرجح)، مصر 2021

الإجمالي	محل الإقامة							الإقامة		نتيجة المقابلة ونسبة الاستجابة		
	محافظات الحدود (1)	وجه قبلى			وجه بحرى			محافظات حضرية	ريف			حضر
		ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي					
الأسر المعيشية												
34282	1892	8592	4193	12785	8947	4130	13077	6528	18062	16220	المختارة	
32912	1826	8361	3992	12353	8669	3949	12618	6115	17541	15371	الموجودة	
30667	1565	8033	3717	11750	8318	3586	11904	5448	16807	13860	تمت	
93.2	85.7	96.1	93.1	95.1	96.0	90.8	94.3	89.1	95.8	90.2	نسبة الاستجابة في الأسر المعيشية(2)	
السيدات المؤهلات												
21267	1136	6238	2389	8627	6072	2214	8286	3218	12657	8610	تم تحديدهن	
20481	1089	6123	2276	8399	5883	2103	7986	3007	12343	8138	تمت مقابلتهن	
96.3	95.9	98.2	95.3	97.4	96.9	95.0	96.4	93.4	97.5	94.5	نسبة الاستجابة للسيدات(3)	
الشباب/الشابات المؤهلين												
21394	1242	5681	2804	8485	5200	2546	7746	3921	11212	10182	تم تحديدهم	
17603	1014	4738	2353	7091	4207	2069	6276	3222	9219	8384	تمت مقابلتهم	
82.3	81.6	83.4	83.9	83.6	80.9	81.3	81.0	82.2	82.2	82.3	نسبة الاستجابة للشباب/الشابات(4)	

(1) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

(2) الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها / الأسر المعيشية الموجودة.

(3) السيدات المؤهلات اللاتي تمت مقابلتهن / السيدات المؤهلات اللاتي تم تحديدهن.

(4) الشباب أو الشباب المؤهلين الذين تم مقابلتهم / الشباب أو الشباب المؤهلين الذين تم تحديدهم.

جدول 2 دعم الأسر المعيشية

نسبة الأسر المعيشية التي تم حصولها على دعم خارجي من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، حسب الحضر والريف ومحل الإقامة، مصر 2021

الخصائص الخلفية	كرامه وتكافل	بطاقة تموين	معاش الضمان	دعم نقدي آخر من مصدر حكومي	معاش العمالة المؤقتة أثناء جائحة كورونا	دعم نقدي من أي منظمة غير حكومية	العدد
الإقامة							
حضر	6.4	82.5	6.4	7.3	2.2	0.7	13860
ريف	12.3	91.9	6.4	6.0	2.6	0.5	16807
محل الإقامة							
المحافظات الحضرية	5.4	77.5	6.2	8.6	2.0	0.8	5448
وجه بحري	6.2	91.0	6.7	7.0	1.7	0.4	11904
حضر	4.3	87.3	6.7	7.4	1.7	0.6	3586
ريف	7.0	92.4	6.7	6.8	1.7	0.4	8318
وجه قبلي	16.1	88.9	6.1	5.1	3.4	0.8	11750
حضر	9.9	84.4	6.5	5.4	2.9	0.8	3717
ريف	19.3	91.2	5.9	5.0	3.7	0.7	8033
محافظات الحدود ⁽¹⁾	5.4	88.0	3.1	4.9	1.9	0.5	1565
الإجمالي	9.7	87.8	6.4	6.6	2.4	0.6	30667
⁽¹⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.							

خصائص الأسر المعيشية والمستجيبات

جدول 3 خصائص الأسر المعيشية											
التوزيع النسبي للأسر المعيشية حسب نوع رب الأسرة، متوسط حجم الأسرة بحسب مكان الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021											
الإجمالي	محل الإقامة							الإقامة			
	محافظات الحدود ⁽¹⁾	وجه قبلى			وجه بحرى						
		ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر		
نوع رب الأسرة											
82.7	88.6	83.4	81.5	82.8	84.7	81.0	83.7	79.6	84.2	80.7	ذكر
17.3	11.4	16.6	18.5	17.2	15.3	19.0	16.3	20.4	15.8	19.3	أنثى
4.04	4.54	4.45	4.05	4.32	3.95	3.82	3.91	3.77	4.17	3.88	متوسط حجم الأسرة
30667	1565	8033	3717	11750	8318	3586	11904	5448	16807	13860	العدد
لا يتضمن محافظة شمال سيناء.											

جدول 4 الخصائص الخلفية للمستجيبات			
التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفى الفئة العمرية 15-49 حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021			
الخصائص الخلفية	النسبة المرجحة	العدد المرجح	العدد غير المرجح
العمر			
19 – 15	1.9	397	397
24 – 20	10.8	2220	2157
29 – 25	15.9	3247	3267
34 – 30	20.0	4091	4135
39 – 35	20.5	4207	4195
44 – 40	17.6	3595	3586
49 – 45	13.3	2723	2744
الحالة الزوجية			
متزوجة	93.0	19044	19018
مطلقة/ منفصلة	4.0	823	853
أرملة	3.0	614	610
الحالة التعليمية			
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	16.4	3362	3281
لم تتم المرحلة الابتدائية	5.0	1026	892
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	20.8	4257	4216
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	57.8	11837	12092
الحالة العملية			
تحصل على عائد نقدي	16.5	3381	3258
لا تحصل على عائد نقدي	83.5	17100	17223
الإجمالي	100.0	20481	20481

جدول 4-أ الخصائص الخلفية للمستجيبات حسب الإقامة و المحافظة			
التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفى الفئة العمرية 15-49 حسب الإقامة (حضر-ريف)، محل الإقامة، والمحافظة، مصر 2021			
الخصائص الخلفية	النسبة المرححة	العدد المرحح	العدد غير المرحح
الإقامة			
حضر	38.1	7797	8138
ريف	61.9	12684	12343
محل الإقامة			
المحافظات الحضرية	14.6	2989	3007
وجه بحري	45.2	9266	7986
حضر	11.3	2308	2103
ريف	34.0	6958	5883
وجه قبلى	39.1	8000	8399
حضر	11.5	2346	2276
ريف	27.6	5655	6123
محافظات الحدود ⁽¹⁾	1.1	226	1089
المحافظات الحضرية			
القاهرة	8.4	1723	822
الإسكندرية	4.8	979	841
بورسعيد	0.7	144	671
السويس	0.7	143	673
وجه بحري			
دمياط	1.6	318	733
الدقهلية	6.7	1377	824
الشرقية	8.4	1714	1096
القليوبية	6.3	1290	942
كفر الشيخ	3.7	750	874

تابع جدول 4-أ الخصائص الخلفية للمستجيبات حسب الإقامة و المحافظة			
الخصائص الخلفية	النسبة المرححة	العدد المرجح	العدد غير المرجح
الغربية	5.3	1083	804
المنوفية	4.4	899	846
البحيرة	7.6	1549	1103
الإسماعيلية	1.4	287	764
وجه قبلي			
الجيزة	9.3	1907	947
بنى سويف	3.7	757	983
الفيوم	4.0	813	991
المنيا	5.8	1194	935
أسيوط	4.6	947	977
سوهاج	5.2	1075	1000
قنا	3.5	713	936
أسوان	1.5	306	804
الأقصر	1.4	287	826
محافظات الحدود			
البحر الأحمر	0.3	69	267
الوادى الجديد	0.2	50	291
مطروح	0.4	86	336
جنوب سيناء	0.1	21	195
⁽¹⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.			

الإنجاب

جدول 5 الإنجاب الحالي حسب محل الإقامة

معدلات الإنجاب التفصيلية ومعدل الإنجاب الكلى ومعدل الإنجاب العام ومعدل المواليد
الخام فى الثلاث سنوات السابقة على المسح حسب محل الإقامة، مصر 2021

الإجمالي	محل الإقامة								الإقامة		العمر
	محافظات الحدود ⁽¹⁾	وجه قبلى			وجه بحرى			محافظات حضرية			
		ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي				
50	32	73	35	61	60	30	51	16	65	27	19 – 15
170	179	222	106	187	202	122	180	100	211	108	24 – 20
169	226	212	148	194	149	154	150	147	181	150	29 – 25
112	136	133	128	131	92	110	97	106	111	115	34 – 30
53	89	69	63	67	37	53	42	51	52	55	39 – 35
13	16	14	23	17	9	12	10	15	11	16	44 – 40
2	4	2	3	2	1	2	2	2	2	2	49 – 45
2.85	3.41	3.63	2.52	3.30	2.75	2.41	2.66	2.18	3.16	2.37	معدل الإنجاب الكلى
96	113	127	84	114	93	78	89	66	109	77	معدل الإنجاب العام
21.0	23.9	28.1	18.3	25.1	20.6	17.5	19.7	14.6	24.0	16.6	معدل المواليد الخام

ملاحظة: معدلات الإنجاب التفصيلية تعرض لكل 1000 سيدة. المعدلات للفئة العمرية 45-49
يمكن أن تكون متحيزة نتيجة للبيتر. المعدلات تم حسابها بالنسبة للفترة 1-36 شهراً
السابقة على المقابلة.

معدل الإنجاب الكلى: يعرض لكل سيدة.

معدل الإنجاب العام: يعرض لكل 1000 سيدة في العمر 15-44.

معدل المواليد الخام: يعرض لكل 1000 من السكان.

⁽¹⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

جدول 6 الإنجاب حسب الخصائص الخلفية

معدل الإنجاب الكلى لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسح، ونسبة السيدات الحوامل حالياً فى العمر 15-49، ومتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات فى العمر 40-49، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

الخصائص الخلفية	معدل الإنجاب الكلى	نسبة الحوامل حالياً فى العمر 15-49	متوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات فى العمر 40-49
الإقامة			
حضر	2.37	2.9	3.1
ريف	3.16	4.8	3.7
محل الإقامة			
المحافظات الحضرية	2.18	2.8	3.0
وجه بحري	2.66	3.5	3.3
حضر	2.41	2.7	3.1
ريف	2.75	3.7	3.3
وجه قبلى	3.30	5.1	3.9
حضر	2.52	3.9	3.3
ريف	3.63	5.6	4.2
محافظات الحدود ⁽¹⁾	3.41	4.8	3.9
الحالة التعليمية			
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	3.40	2.6	3.9
لم تتم المرحلة الابتدائية	3.58	4.4	3.5
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	3.14	3.9	3.5
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	2.64	4.3	3.2
مؤشر الثروة			
أدنى مستوى	2.75	2.5	4.0
المستوى الثاني	3.12	4.3	3.6
المستوى الأوسط	2.92	4.2	3.4
المستوى الرابع	2.83	4.9	3.2
أعلى مستوى	2.66	4.1	3.0
الإجمالي	2.85	4.0	3.5
ملاحظة: معدلات الإنجاب الكلية تم حسابها بالنسبة للفترة 1-36 شهراً السابقة على المقابلة.			
⁽¹⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.			

جدول 7 التخطيط للإنجاب

التوزيع النسبي لمواليد السيدات في العمر 15-49 سنة في الخمس سنوات السابقة على المسح (يتضمن حالات الحمل الحالي) حسب التخطيط للإنجاب وترتيب المولود وعمر الأم، مصر 2021

عدد المواليد	الإجمالي	التخطيط للمولود				ترتيب المولود وعمر الأم عند الإنجاب
		بيانات مفقودة	غير مرغوب فيه	مرغوب فيه بعد فترة	مرغوب فيه فى ذلك الوقت	
ترتيب المولود						
3466	100.0	0.0	.4	2.0	97.6	1
3916	100.0	0.0	1.5	15.1	83.5	2
3529	100.0	0.0	13.5	10.6	75.9	3
3459	100.0	0.	33.8	6.1	60.0	+ 4
عمر الأم عند الإنجاب						
1417	100.0	0.0	.8	6.3	93.0	أقل من 20
4217	100.0	0.0	2.8	11.5	85.7	20 – 24
4109	100.0	0.	10.0	9.9	80.1	25 – 29
2966	100.0	0.0	19.1	6.8	74.1	30 – 34
1367	100.0	0.0	34.9	3.9	61.1	35 – 39
273	100.0	0.0	45.2	3.6	51.2	40 – 44
21	*	*	*	*	*	45 – 49
14370	100.0	0.	11.8	8.7	79.5	الإجمالي
ملاحظة: * تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها.						

جدول 8 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفي العمر 15-49 سنة حسب الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال، حسب عدد الأطفال الأحياء، مصر 2021

الإجمالي	عدد الأطفال الأحياء ⁽¹⁾							الرغبة في مزيد من الأطفال
	+6	5	4	3	2	1	صفر	
12.9	0.9	2.1	3.0	5.2	14.7	43.0	85.1	تريد طفلاً حالياً ⁽²⁾
11.2	0.3	1.9	2.2	5.3	18.8	43.9	3.5	تريد طفلاً بعد فترة ⁽³⁾
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	تريد طفلاً ولم تحدد الوقت
4.4	1.2	2.4	2.6	4.5	8.3	2.0	1.3	لم تقرر
66.3	84.4	84.3	85.0	81.5	55.2	8.2	0.2	لا تريد أطفالاً آخرين
2.0	9.5	6.3	3.7	1.0	0.1	0.0	0.2	أجرت عملية تعقيم
3.1	3.6	3.0	3.6	2.5	2.9	2.9	9.6	لا يمكن أن تحمل
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	بيانات مفقودة
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي
19018	1018	1558	3628	5752	4501	1898	663	العدد

⁽¹⁾ عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي.

⁽²⁾ ترغب في إنجاب الطفل التالي خلال سنتين.

⁽³⁾ ترغب في تأجيل الطفل التالي لمدة سنتين أو أكثر.

تنظيم الأسرة

جدول 9 الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب محل الإقامة											
التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفى العمر 15 – 49 حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً حسب الإقامة (ريف – حضر) ومحل الإقامة، مصر 2021											
الوسائل	محل الإقامة								الإقامة		الوسائل
	محافظة الحدود ⁽¹⁾	وجه قبلى			وجه بحرى			محافظة حضرية			
		ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي		ريف	حضر	
أي وسيلة	66.4	65.3	57.4	63.1	59.1	71.8	70.3	71.4	70.5	65.3	68.1
أي وسيلة حديثة	64.7	61.9	56.3	61.6	57.8	70.5	67.7	69.8	67.8	64.1	65.8
تعقيم المرأة	2.0	1.2	2.2	1.6	2.0	2.2	1.8	2.1	1.9	2.2	1.8
الحبوب	19.5	21.7	18.7	19.9	19.1	21.1	20.9	21.0	15.6	20.0	18.6
اللولب	29.4	26.4	17.6	27.5	20.4	34.0	35.0	34.3	39.3	26.6	34.2
الحقن	10.2	8.6	13.5	8.7	12.1	10.6	5.9	9.5	7.4	11.9	7.3
كبسولة تحت الجلد	2.6	1.7	4.1	2.7	3.7	2.0	2.0	2.0	1.9	2.9	2.2
الواقى الذكرى	0.8	1.9	0.3	1.2	0.6	0.5	1.7	0.8	1.6	0.4	1.5
حاجز مهبلية/أقراص فوارة/كريم/مرهم	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2
أي وسائل تقليدية	1.7	3.4	1.2	1.5	1.3	1.3	2.5	1.6	2.7	1.3	2.3
فترة الأمان	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.7	0.1	0.5
القذف الخارجى	0.5	1.5	0.1	0.6	0.2	0.4	0.9	0.5	1.5	0.2	1.0
إطالة فترة الرضاعة	0.8	1.6	1.0	0.8	1.0	0.7	1.1	0.8	0.4	0.9	0.8
وسائل أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
لا تستخدم حالياً	33.6	34.7	42.6	36.9	40.9	28.2	29.7	28.6	29.5	34.7	31.9
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات المتزوجات حالياً	19018	1026	5741	2096	7837	5552	1915	7467	2688	11615	7403
ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة. فإن الوسيلة الأكثر فاعلية فقط هي التي تم عرضها في الجدول.											
لا يتضمن محافظة شمال سيناء.											

جدول 10 الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب الخصائص الاجتماعية والديموجرافية المختارة																	
التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً فى الفئة العمرية 15-49 سنة حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً، حسب الخصائص الاجتماعية والديموجرافية المختارة، مصر 2021																	
الخصائص الخلفية	أي وسيلة	أي وسيلة حديثة	وسيلة حديثة						أي وسيلة تقليدية	وسيلة تقليدية				لا تستخدم وسيلة حالياً	الإجمالي	عدد السيدات المتزوجات حالياً	
			تعقيم المرأة	حبوب	لولب	حقن	كبسولة تحت الجلد	الواقى الذكري		حاجز مهبل/ أقراص فموية/ كريمة	فترة الأمان	القذف الخارجى	إطالة فترة الرضاعة				أخرى
العمر																	
19-15	39.0	36.7	0.0	16.1	16.4	3.2	1.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.4	1.8	0.0	61.0	100.0	376
24-20	52.3	50.2	0.0	20.6	19.6	7.4	2.4	0.2	0.0	2.1	0.0	0.2	1.9	0.0	47.7	100.0	2082
29- 25	61.9	59.1	0.2	21.2	24.7	9.5	2.8	0.6	0.0	2.8	0.0	0.5	2.1	0.0	38.1	100.0	3127
34-30	69.7	68.3	1.2	22.8	29.4	10.6	3.1	1.0	0.2	1.4	0.2	0.5	0.6	0.1	30.3	100.0	3933
39- 35	75.2	73.8	3.0	20.4	34.3	11.6	3.3	1.1	0.1	1.4	0.1	0.6	0.5	0.0	24.8	100.0	3918
44- 40	74.8	73.7	4.3	17.3	35.8	13.0	2.3	0.8	0.1	1.1	0.1	0.6	0.0	0.0	25.2	100.0	3239
49- 45	57.4	56.0	3.2	12.8	29.7	7.8	1.5	0.8	0.3	1.3	0.5	0.8	0.0	0.1	42.6	100.0	2343
عدد الأطفال الأحياء																	
0	0.8	0.8	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.2	100.0	865
2 - 1	57.0	54.9	0.1	19.7	26.5	5.9	1.6	0.9	0.1	2.1	0.3	0.7	1.0	0.0	43.0	100.0	6555
4 - 3	77.0	75.4	2.1	21.2	35.7	12.3	3.2	0.9	0.1	1.6	0.2	0.5	0.8	0.0	23.0	100.0	9094
+ 5	73.6	72.3	7.7	18.7	23.3	17.3	4.5	0.6	0.2	1.3	0.5	0.2	0.5	0.1	26.4	100.0	2504
الحالة التعليمية																	
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	66.0	65.3	3.5	15.0	23.7	18.9	3.7	0.4	0.1	0.7	0.1	0.2	0.5	0.0	34.0	100.0	2979
لم تتم المرحلة الابتدائية	65.0	63.6	3.4	16.4	27.5	13.6	2.6	0.2	0.1	1.4	0.0	0.3	1.1	0.0	35.0	100.0	800
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	62.3	60.6	1.5	18.5	25.2	11.4	3.2	0.5	0.1	1.7	0.1	0.4	1.1	0.0	37.7	100.0	3917
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	68.0	66.1	1.7	21.4	32.7	7.0	2.2	1.1	0.1	1.9	0.4	0.7	0.8	0.0	32.0	100.0	11322
الحالة العملية																	
تحصل على عائد نقدي	70.9	69.5	2.5	17.6	36.3	9.3	2.3	1.4	0.1	1.4	0.4	0.7	0.3	0.0	29.1	100.0	2816
لا تحصل على عائد نقدي	65.6	63.8	1.9	19.8	28.2	10.3	2.7	0.7	0.1	1.7	0.2	0.5	0.9	0.0	34.4	100.0	16202
الاجمالي	66.4	64.7	2.0	19.5	29.4	10.2	2.6	0.8	0.1	1.7	0.3	0.5	0.8	0.0	33.6	100.0	19018
ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة. فإن الوسيلة الأكثر فاعلية فقط هي التي يتم عرضها في الجدول.																	

جدول 11 مصادر الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للمستخدمات حالياً للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة حسب أحدث مصدر وحسب وسائل محددة، مصر 2021

المصدر	حبوب	لولب	حقن	كبسولات تحت الجلد	تعقيم المرأة	الإجمالي ⁽¹⁾
قطاع حكومي	54.0	62.8	83.3	95.4	17.3	62.5
مستشفى حضري (عام/مركزي)	1.4	8.4	3.0	14.8	15.0	5.8
وحدة صحية حضرية	6.6	14.0	9.9	15.2	0.0	10.5
مكتب صحة	4.4	4.2	4.1	5.7	0.0	4.1
مستشفى ريفي (تكامل)	0.7	2.3	2.2	6.0	0.3	1.8
وحدة صحية ريفية	40.1	30.8	63.2	49.6	0.0	38.1
مركز رعاية أمومة وطفولة	0.7	2.3	0.9	1.5	0.0	1.5
عيادات متنقلة	0.0	0.7	0.0	2.1	0.0	0.4
مستشفى جامعي/تعليمي	0.0	0.1	0.0	0.3	1.7	0.1
مؤسسة تأمين صحي	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
وحدات حكومية أخرى	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
قطاع طبي خاص	45.7	37.1	16.5	4.5	81.8	37.4
منظمة غير حكومية	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.3
مستشفى خاص/عيادة	1.5	34.9	1.3	4.2	81.5	19.3
طبيب خاص	0.4	1.5	0.2	0.0	0.3	0.8
صيدلية	43.7	0.0	14.9	0.0	0.0	16.9
طبي خاص آخر (جامع، كنيسة)	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
غير طبي آخر	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
أقارب/أصدقاء	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
أخرى/لا أحد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
غير مبين	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات المستخدمات حالياً	3747	5264	1902	506	355	11442

⁽¹⁾ تشمل مستخدمات كبسولة تحت الجلد والوسائل الموضعية (حاجز مهبل/أقراص فوارة/كريم) والتي ليس لها توزيع منفصل.

جدول 12 الحاجة والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 ولديهم حاجة غير ملبأة لتنظيم الأسرة، ونسبة من لبي حاجته لتنظيم الأسرة، الطلب الكلي على تنظيم الأسرة، ونسبة الطلب على وسائل منع الحمل الملبأة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

عدد السيدات	نسبة الطلب المشبع للوسائل الحديثة ⁽³⁾	نسبة الطلب المشبع ⁽²⁾	إجمالي الطلب الكلي على تنظيم الأسرة ⁽¹⁾			الحاجة الملبأة لتنظيم الأسرة (الاستخدام الحالي)			الحاجة غير الملبأة لتنظيم الأسرة			الخصائص الخلفية
			الإجمالي	عدم الرغبة في أطفال آخرين	للمساعدة بين الولادات	الإجمالي	عدم الرغبة في أطفال آخرين	للمساعدة بين الولادات	الإجمالي	عدم الرغبة في أطفال آخرين	للمساعدة بين الولادات	
العمر												
376	66.5	70.6	55.2	4.6	50.6	39.0	3.2	35.7	16.2	1.3	14.9	19 – 15
2082	74.0	77.1	67.9	23.2	44.6	52.3	19.1	33.2	15.5	4.1	11.4	24 – 20
3127	76.2	79.9	77.6	44.9	32.7	62.0	37.3	24.6	15.6	7.6	8.0	29 – 25
3933	81.8	83.5	83.5	67.4	16.1	69.7	57.6	12.1	13.8	9.8	4.0	34 – 30
3918	84.7	86.3	87.2	80.5	6.7	75.2	70.0	5.2	12.0	10.5	1.5	39 – 35
3239	85.3	86.6	86.4	84.4	2.1	74.8	73.4	1.4	11.6	10.9	0.7	44 – 40
2343	76.8	78.7	73.0	72.3	0.7	57.4	57.0	0.4	15.5	15.2	0.3	49 – 45
الإقامة												
7403	80.5	83.4	81.7	66.9	14.8	68.2	56.9	11.3	13.5	10.0	3.5	حضر
11615	80.8	82.4	79.3	61.9	17.4	65.4	52.5	12.9	13.9	9.4	4.5	ريف
محل الإقامة												
2688	81.4	84.9	83.3	68.9	14.4	70.8	59.5	11.3	12.6	9.5	3.1	المحافظات الحضرية
7467	84.1	86.0	83.0	67.2	15.8	71.4	59.0	12.4	11.6	8.2	3.4	وجه بحري
1915	81.0	84.1	83.6	69.1	14.5	70.3	59.3	11.0	13.3	9.8	3.5	حضر
5552	85.0	86.6	82.9	66.6	16.2	71.8	59.0	12.8	11.1	7.7	3.4	ريف
7837	76.2	77.9	75.8	58.0	17.9	59.1	46.6	12.5	16.8	11.4	5.4	وجه قبلي
2069	78.9	80.9	78.1	62.6	15.5	63.1	51.7	11.4	14.9	10.8	4.1	حضر
5741	75.1	76.7	74.9	56.1	18.8	57.4	44.5	12.9	17.5	11.6	5.9	ريف
1026	79.9	84.2	77.5	58.4	19.1	65.3	49.7	15.6	12.2	8.8	3.5	محافظات الحدود ⁽⁴⁾
الحالة التعليمية												
2,979	82.0	82.8	79.7	71.7	8.0	66.0	60.4	5.6	13.7	11.3	2.4	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
1,032	82.6	84.3	78.4	67.8	10.5	66.1	58.0	8.0	12.3	9.8	2.5	لم تتم المرحلة الابتدائية
3,685	78.2	80.5	76.8	56.6	20.2	61.9	47.1	14.8	15.0	9.6	5.4	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
11,322	81.0	83.4	81.6	63.5	18.2	68.1	54.3	13.7	13.6	9.1	4.4	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
19018	80.7	82.8	80.2	63.7	16.5	66.4	54.1	12.3	13.8	9.6	4.2	الإجمالي
ملحوظة: أرقام هذا الجدول تمثل المفهوم المراجع للحاجة غير الملبأة التي تم شرحها في برادلي، 2012.												
⁽¹⁾ الطلب الكلي هو مجموع الحاجة الملبأة وغير الملبأة.												
⁽²⁾ نسبة الطلب المشبع هو عبارة عن الحاجة الملبأة/ الطلب الكلي.												
⁽³⁾ الوسائل الحديثة تتضمن تعقيم المرأة، تعقيم الرجل، الحبوب، اللولب، الحقن، كبسولات تحت الجلد، الواقي الذكري، حاجز مهبل/أقراص موضعية/مراهم/كريم.												
⁽⁴⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.												

وفيات الأطفال ووفيات الرضع

جدول 13 معدلات وفيات الطفولة المبكرة					
معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال ووفيات الأطفال دون الخامسة من العمر					
ووفيات الأطفال دون الخامسة من العمر					
السنين السابقة للمسح	وفيات حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولادة ⁽¹⁾	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
4 – 0	18	7	25	3	28
9 – 5	16	10	26	4	29
14 – 10	18	12	30	3	33

⁽¹⁾ يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثي الولادة.

جدول 14 معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب الإقامة

معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال دون الخامسة في فترة العشر سنوات السابقة على المسح حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مصر 2021

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية	وفيات حديثي الولادة	وفيات ما بعد حديثي الولادة ⁽¹⁾	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
الإقامة					
حضر	15	7	22	2	24
ريف	18	9	27	4	31
محل الإقامة					
المحافظات الحضرية	13	6	19	2	21
وجه بحري	14	7	21	2	23
حضر	14	5	19	1	20
ريف	14	7	21	3	24
وجه قبلي	21	11	32	5	37
حضر	18	9	27	4	31
ريف	21	12	33	6	39
محافظات الحدود ⁽²⁾	10	4	14	3	17

⁽¹⁾ يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثي الولادة.

⁽²⁾ لا يتضمن محافظه شمال سيناء.

رعاية الأمومة

جدول 15 مؤشرات رعاية الأمومة وفقاً لبعض الخصائص الديموجرافية والاجتماعية

نسبة الأمهات اللاتي حصلن على أي رعاية حمل و رعاية حمل منتظمة من مقدم خدمة طبية في آخر مولود حي لها في الخمس سنوات السابقة عن المسح وعلى الأقل حقة تيتانوس واحدة خلال حملها الأخير، ونسبة الأمهات اللاتي حصل آخر طفل حي لهن خلال الخمس سنوات السابقة على المسح على حماية ضد مرض التيتانوس الوليدي، ونسبة المواليد الأحياء في آخر خمس سنوات قبل المسح الذين ولدوا على يد مقدم خدمة طبية، والذين ولدوا في منشأة صحية، والذين ولدوا بعملية قيصرية، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

الخصائص الخلفية	نسبة الأمهات اللاتي لديهن قبل آخر مولود حي:			عدد الأمهات	نسبة الأمهات اللاتي حصلن على حماية من التيتانوس الوليدي (2)	نسبة المواليد الذين ولدوا خلال الخمس سنوات السابقة للمسح:			عدد المواليد
	أي رعاية حمل	منتظمة (1)	رعاية حمل			على الأقل حقة	تيتانوس واحدة	في منشأة صحية	
عمر الأم عند ميلاد الطفل									
أقل من 20 سنة	97.4	93.0	78.5	60.5	680	96.8	94.6	67.6	1309
20 – 34	96.7	90.0	71.5	48.5	7697	97.1	94.6	72.6	10173
35 – 49	94.8	87.6	54.9	42.8	1351	97.2	95.0	74.2	1485
ترتيب المولود									
1	98.7	95.5	77.5	62.3	1778	98.8	97.1	75.8	3314
2 – 3	96.9	90.8	73.2	41.0	5386	97.4	95.2	73.7	6720
4 – 5	94.5	84.9	59.2	55.1	2170	94.7	91.0	64.7	2475
+ 6	90.8	77.0	41.3	56.6	394	91.1	87.0	63.0	458
الإقامة									
حضر	96.0	91.4	58.6	38.9	3487	98.5	97.4	77.4	4528
ريف	96.7	89.1	75.7	53.8	6241	96.4	93.3	69.6	8439
محل الإقامة									
المحافظات الحضرية	95.4	91.4	57.6	37.0	1161	98.2	97.1	75.0	1515
وجه بحري	98.0	93.3	71.6	43.3	3472	99.0	97.2	78.5	4429
حضر	98.7	95.6	59.5	34.9	848	99.1	98.7	83.8	1060
ريف	97.7	92.6	75.4	45.9	2624	99.0	96.8	76.9	3369
وجه قبلي	95.4	86.3	71.9	57.2	4550	95.1	91.7	66.4	6261
حضر	94.2	87.9	59.2	44.2	1098	98.4	96.7	76.2	1413
ريف	95.8	85.8	76.4	61.8	3452	94.1	90.2	63.3	4848
محافظات الحدود (4)	95.5	84.5	48.5	36.1	545	97.1	95.2	53.6	762

تابع جدول 15 مؤشرات رعاية الأمومة وفقاً لبعض الخصائص الديموجرافية والاجتماعية

الخصائص الخلفية	نسبة الأمهات اللاتي لديهن قبل آخر مولود حي:			نسبة الأمهات اللاتي حصلن طفلهن الحي الأخير على حماية من التيتانوس الوليدي (2)	عدد الأمهات	نسبة المواليد الذين ولدوا خلال الخمس سنوات السابقة للمسح:			عدد المواليد
	أي رعاية حمل	منتظمة (1)	رعاية حمل			تيتانوس واحدة	على الأقل حقنة	خدمة طبية (3)	
الحالة التعليمية									
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	93.3	81.9	67.2	51.2	1069	92.0	88.0	61.6	1417
لم تتم المرحلة الابتدائية	92.5	83.7	66.1	47.5	359	95.2	93.2	67.0	491
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوى	95.5	86.2	70.0	52.5	2295	96.0	93.5	67.3	3229
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	97.7	93.2	70.4	46.7	6005	98.6	96.5	76.6	7830
الإجمالي	96.5	89.9	69.8	48.6	9728	97.1	94.7	72.2	12967

ملحوظة: مؤشرات رعاية الحمل تتوافق مع مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية 5,5: تغطية رعاية الحمل (على الأقل زيارة واحدة وعلى الأقل أربع زيارات). يشيرون إلى رعاية الحمل التي حصلت عليها الأم خلال حملها في آخر مولود حي. وبالمثل، فإن نسبة الأمهات اللاتي حصلن على حقنة تطعيم تيتانوس واحدة على الأقل تشير إلى آخر مولود حي. ولذلك فإن مؤشرات رعاية الحمل و التيتانوس لا يمكن مقارنتها لمثيلاتها المحسوبة في المسوح السكانية الصحية السابقة، والتي كانت تبني على كل المواليد في الخمس سنوات السابقة للمسح. وأخيراً، وبسبب الاختلافات في المعلومات المجمعة عن تطعيم التيتانوس على مدى الحياة، يشير المؤشر إلى نسبة الأمهات اللاتي تم حماية مواليدهن الأخيرة من التيتانوس الوليدي لا يجب مقارنتهم بتقديرات حماية آخر المواليد الأحياء من التيتانوس الوليدي المنشورة في تقرير المسح السكاني الصحي – مصر 2008.

(1) تعتبر السيدة حصلت على رعاية حمل منتظمة إذا كانت السيدة حصلت على 4 زيارات أو أكثر خلال فترة الحمل.

(2) مقدم خدمة مدرب يتضمن الطبيب أو الممرضة/الداية.

(3) يتضمن الأمهات اللاتي حصلن على حقنتين خلال حملهن في مولودهن الحي الأخير، أو اللاتي حصلن على حقنتين أو أكثر (والأخيرة خلال 3 سنوات من آخر مولود حي)، أو ثلاث حقن أو أكثر (والأخيرة خلال 5 سنوات من آخر مولود حي)، أو أربع حقن أو أكثر (والأخيرة خلال 10 سنوات من آخر مولود حي)، أو خمس حقن أو أكثر خلال أي وقت سابق لآخر مولود حي.

(4) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

جدول 16 مؤشرات رعاية الأمومة حسب المحافظات

نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة من مقدم خدمة طبي في آخر مولود حي لهن في الخمس سنوات السابقة عن المسح، ونسبة الأمهات اللاتي حصل آخر طفل حي لهن خلال الخمس سنوات السابقة على المسح على حماية ضد مرض التيتانوس الوليدي، ونسبة المواليد الأحياء في آخر خمس سنوات قبل المسح الذين ولدوا على يد مقدم خدمة طبي، والذين ولدوا بعملية قيصرية، حسب المحافظة، مصر 2021

عدد المواليد	نسبة المواليد خلال الخمس سنوات السابقة على المسح وولدوا بواسطة		عدد الأمهات	نسبة الأمهات اللاتي حصلن طفلهن الأخير على حماية ضد التيتانوس الوليدي ⁽²⁾	نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة قبل مولودهن الأخير ⁽¹⁾	المحافظات
	مقدم خدمة طبية ⁽³⁾	عملية قيصرية				
1515	98.2	75.0	1161	37.0	91.4	المحافظات الحضرية
438	97.7	73.7	331	30.8	88.2	القاهرة
419	98.8	76.1	321	46.7	97.2	الإسكندرية
300	99.3	91.3	230	57.4	95.7	بورسعيد
358	99.2	69.0	279	31.5	89.2	السويس
4429	99.0	78.5	3472	43.3	93.3	وجه بحري
350	100.0	82.5	269	32.1	96.6	دمياط
446	99.5	82.3	348	34.2	93.9	الدقهلية
636	98.7	72.3	503	47.7	94.6	الشرقية
518	99.0	79.5	399	42.2	94.0	القليوبية
480	99.4	88.4	385	44.2	88.9	كفر الشيخ
433	99.8	84.3	333	36.6	91.6	الغربية
471	99.4	73.0	374	55.9	94.1	المنوفية
656	97.6	77.8	509	44.2	92.7	البحيرة
439	99.8	64.7	352	50.5	93.2	الإسماعيلية
6261	95.1	66.4	4550	57.2	86.3	وجه قبلي
538	97.8	67.3	428	33.8	86.7	الجيزة
749	92.9	61.5	547	58.8	89.6	بنى سويف

تابع جدول 16 مؤشرات رعاية الأمومة حسب المحافظات

عدد المواليد	نسبة المواليد خلال الخمس سنوات السابقة على المسح وولدها بواسطة		عدد الأمهات	نسبة الأمهات اللاتي حصلن على الرعاية الصحية على حمل منتظمة قبل مولودهن الأخير ⁽¹⁾	نسبة الأمهات اللاتي حصلن على الرعاية الصحية على حمل منتظمة قبل مولودهن الأخير ⁽²⁾	المحافظات
	مقدم خدمة طبية ⁽³⁾	عملية قيصرية				
790	67.0	89.3	578	72.7	85.5	الفيوم
691	68.5	95.5	505	63.5	83.8	المنيا
805	66.6	95.3	548	49.9	83.6	أسيوط
800	65.1	95.4	553	69.1	84.4	سوهاج
785	63.3	94.3	549	68.7	88.0	قنا
541	68.3	99.8	421	53.3	94.3	أسوان
562	77.3	99.7	421	63.1	93.6	الأقصر
762	53.6	97.1	545	36.1	84.5	محافظات الحدود
168	70.8	100.0	133	48.9	93.2	البحر الأحمر
159	66.0	97.4	124	51.9	88.3	الوادى الجديد
333	39.3	95.2	206	20.8	75.7	مطروح
102	66.7	100.0	82	41.5	94.0	جنوب سيناء
12967	72.2	97.1	9728	48.6	89.9	الإجمالي

⁽¹⁾ تعتبر السيدة حصلت على رعاية حمل منتظمة إذا كانت السيدة حصلت على 4 زيارات أو أكثر خلال فترة الحمل.

⁽²⁾ يتضمن الأمهات اللاتي حصلن على حقنتين خلال حملهن في مولودهن الحي الأخير، أو اللاتي حصلن على حقنتين أو أكثر (والأخيرة خلال 3 سنوات من آخر مولود حي)، أو ثلاث حقن أو أكثر (و الأخيرة خلال 5 سنوات من آخر مولود حي)، أو أربع حقن أو أكثر (والأخيرة خلال 10 سنوات من آخر مولود حي)، أو خمس حقن أو أكثر خلال أي وقت سابق لآخر مولود حي.

⁽³⁾ مقدم خدمة مدرب يتضمن الطبيب أو الممرضة/الداية.

التطعيمات وصحة ونماء الطفل

جدول 17 التطعيمات حسب الخصائص الخلفية

نسبة الأطفال في العمر 18-29 شهراً الذين تم رؤية تطعيماتهم المسجلة ونسبة الذين تلقوا تطعيمات محددة في وقت المسح (حسب وثيقة التطعيم أو ما ذكرته الأم)، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	تم الاطلاع على وثيقة التطعيم	الجنس	الخماسي ⁽¹⁾				شلل الأطفال				الحصبة	كل التطعيمات ⁽³⁾	لا توجد تطعيمات ⁽²⁾	عدد الأطفال
			1	2	3	تنشيطية	صفر	1	2	3				
النوع														
ذكر	70.0	98.9	98.7	96.7	95.9	65.2	98.5	96.8	95.4	94.3	96.8	91.6	1.0	1292
أنثى	66.1	99.5	99.4	96.4	93.8	60.0	99.2	96.7	95.5	93.9	95.4	88.1	0.4	1237
الإقامة														
حضر	61.7	98.8	98.9	95.1	92.3	56.2	98.7	97.1	94.9	92.9	93.8	85.6	1.1	895
ريف	71.6	99.5	99.1	97.4	96.3	66.1	99.0	96.5	95.7	94.7	97.4	92.2	0.5	1634
محل الإقامة														
المحافظات الحضرية	57.6	97.2	97.6	93.3	88.7	51.5	97.2	96.2	94.5	91.9	90.8	80.3	2.4	296
وجه بحري	69.3	99.2	99.0	96.5	96.1	63.3	98.6	96.7	96.2	95.6	97.1	93.2	0.8	847
حضر	62.9	99.5	99.5	95.9	95.9	57.0	99.5	96.1	94.6	94.6	97.4	92.4	0.5	222
ريف	71.6	99.1	98.9	96.8	96.2	65.5	98.3	96.9	96.7	95.9	97.0	93.5	0.9	625
وجه قبلي	69.9	99.9	99.5	97.5	95.5	64.9	99.6	97.0	95.1	93.4	96.7	89.5	0.0	1237
حضر	64.6	100.0	100.0	96.3	92.9	60.1	99.7	99.3	96.0	92.6	93.7	84.8	0.0	277
ريف	71.6	99.8	99.3	97.9	96.4	66.5	99.6	96.3	94.8	93.6	97.7	91.0	0.0	960
محافظات الحدود ⁽⁴⁾	68.8	97.7	98.4	97.6	95.4	67.0	97.7	96.1	93.8	93.8	96.3	92.4	1.6	149

تابع جدول 17 التطعيمات حسب الخصائص الخلفية														
الخصائص الخلفية	تم الاطلاع على وثيقة التطعيم	الدرن	الخماسي ⁽¹⁾				شلل الأطفال				الحصبة	كل التطعيمات ⁽³⁾	لا توجد تطعيمات ⁽²⁾	عدد الأطفال
			1	2	3	تنشيطية	صفر	1	2	3				
الحالة التعليمية														
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	65.7	98.6	98.6	96.2	92.7	60.0	98.0	96.3	95.9	94.1	94.1	86.9	1.4	245
لم تتم المرحلة الابتدائية	62.1	99.6	98.8	91.6	91.6	55.0	98.2	94.8	91.2	90.6	90.1	84.1	0.4	121
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	72.1	99.1	98.9	96.0	94.5	65.2	98.5	96.2	94.9	93.6	96.4	90.0	0.5	630
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	67.3	99.4	99.2	97.3	95.7	62.6	99.2	97.3	96.0	94.6	96.9	90.8	0.6	1533
الحالة العملية														
تحصل على عائد نقدي	58.9	98.9	98.9	97.1	93.4	56.5	98.9	98.4	98.4	94.8	96.7	89.0	1.1	230
لا تحصل على عائد نقدي	69.0	99.3	99.1	96.5	95.0	63.2	98.9	96.6	95.1	94.0	96.0	89.9	0.6	2299
الإجمالي	68.1	99.2	99.1	96.6	94.9	62.6	98.9	96.8	95.4	94.1	96.1	89.9	0.7	2529
شلل الأطفال صفر: هو تطعيم شلل الأطفال الذي يعطى للطفل عند الولادة؛ الخماسي- الخماسي التنشيطية، شلل الأطفال التنشيطية؛ طعم الحصبة أو الحصبة الألمانية/الغدة النكافية.														
⁽¹⁾ الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الثلاثي يشمل الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الخماسي.														
⁽²⁾ متاحة فقط في البيانات التي تم جمعها من وثيقة التطعيم.														
⁽³⁾ يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرن، طعم الحصبة أو الحصبة الألمانية/الغدة النكافية، ثلاث جرعات من الطعم الثلاثي وثلاث جرعات من طعم الشلل.														
⁽⁴⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.														

جدول 18 حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر

التوزيع النسبي لأصغر الأطفال أقل من سنتين ويعيشون مع أمهاتهم حسب حالة الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين يرضعون حالياً ونسبة جميع الأطفال الأقل من سنتين ويستخدمون زجاجة بخلمة، حسب عمر الطفل بالأشهر، مصر 2021

العمر بالأشهر	حالة الرضاعة الطبيعية							الإجمالي	نسبة الذين يرضعون حالياً	عدد أصغر الأطفال الأقل من سنتين ويعيشون مع أمهاتهم	نسبة الذين يستخدمون زجاجة بخلمة	الأقل من سنتين عدد الأطفال
	لا يرضع طبيعياً	مطلقة	رضاعة طبيعية مع ماء فقط	رضاعة طبيعية مع لبن آخر	رضاعة طبيعية مع سوائل/ عمير (١)	مع لبن آخر	مع أغذية مكملة					
0 – 1	1.7	57.8	7.7	3.1	19.5	10.1	100.0	98.3	286	36.0	287	
3 – 2	5.1	45.0	11.4	5.4	25.9	7.1	100.0	94.9	395	42.6	404	
5 – 4	7.0	20.7	18.9	4.6	16.9	31.8	100.0	93.0	354	39.9	357	
8 – 6	8.9	6.4	13.3	3.1	5.8	62.6	100.0	91.1	487	36.8	509	
11 – 9	6.3	2.0	6.3	1.5	3.0	81.0	100.0	93.7	498	25.9	512	
17 – 12	21.8	0.9	1.9	1.2	0.5	73.7	100.0	78.2	1188	23.0	1219	
23 – 18	65.3	0.4	0.6	0.0	0.3	33.4	100.0	34.7	1113	12.8	1108	
3 – 0	3.7	50.4	9.9	4.4	23.2	8.4	100.0	96.3	681	39.9	691	
5 – 0	4.8	40.2	13.0	4.5	21.1	16.4	100.0	95.2	1035	39.9	1048	
9 – 6	8.9	5.5	11.8	2.8	5.5	65.5	100.0	91.1	639	34.1	657	
15 – 12	16.6	1.3	2.2	1.3	0.7	77.8	100.0	83.4	790	25.1	814	
23 – 12	42.8	0.6	1.3	0.6	0.4	54.2	100.0	57.2	2301	18.1	2327	
23 – 20	73.8	0.3	0.2	0.0	0.0	25.7	100.0	26.2	729	9.0	727	

ملاحظة: تشير حالة الرضاعة الطبيعية إلى «24 ساعة» (اليوم السابق واللييلة السابقة). والأطفال الذين تم تصنيفهم على أساس أنهم يرضعون ويشربون الماء فقط لا يقومون بأخذ أى أغذية مكملية. وتعتبر فئات لا يرضع طبيعياً، رضاعة طبيعية مطلقة، رضاعة طبيعية مع ماء فقط، سوائل، لبن آخر، والأغذية المكملية (ناشف أو شبه ناشف) ذات طابع هرمي ومتعلقة ببعضها، والنسب الخاصة بهم تعطى إجمالاً 100 %. لذا فإن الأطفال الذين تلقوا لبن الأم وسوائل ولم يتلقوا لبناً آخر ولم يتلقوا أغذية مكملية يتم تصنيفهم في فئة رضاعة طبيعية مع سائل حتى وإن تلقوا ماء فقط. وأى أطفال حصلوا على أغذية مكملية يتم تصنيفهم في هذه الفئة طالما أنهم يرضعون بصورة جيدة.

(1) تتضمن السوائل العصير، مشروبات عصير، مرقة (شربة) أو أى سائل أخرى.

جدول 19 انتشار وعلاج الاسهال

نسبة الأطفال الأقل من خمس سنوات واصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح، ومن بين الأطفال الذين أصيبوا بالإسهال نسبة الذين تم معالجتهم حسب بعض الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021

عدد الأطفال المرضي	محلول معالجة الجفاف (أ)			الذين استشاروا مقدم خدمة طبي			عدد الأطفال	نسبة الأطفال المصابين بالإسهال	الخصائص الخلفية
	أي منهما	المعد بالمنزل	المشترى	مقدم خدمة خاص	مقدم خدمة حكومي	أي مقدم خدمة			
عمر الطفل بالشهور									
146	35.9	1.1	35.9	69.8	5.6	75.4	1072	14.6	أقل من 6
220	38.6	4.6	38.4	80.9	4.8	85.7	1040	23.0	6 – 11
426	44.9	4.5	44.3	77.5	9.6	86.3	2482	18.4	12 – 23
246	41.7	4.8	40.8	77.8	8.5	85.5	2529	10.7	24 – 35
170	39.7	3.0	39.2	77.5	6.4	83.1	2614	7.0	36 – 47
47	(20.3)	(0.3)	(20.3)	(74.8)	(1.7)	(76.5)	1277	3.8	48 – 59
النوع									
639	43.9	4.3	43.5	75.6	7.7	82.8	5597	12.6	ذكر
616	37.0	3.4	36.5	78.8	7.1	85.3	5417	12.1	أنثى
الإقامة									
407	36.5	4.1	36.0	70.2	9.8	79.5	3817	12.5	حضر
848	42.6	3.7	42.2	80.7	6.2	86.3	7197	12.3	ريف
محل الإقامة									
130	40.1	6.8	40.0	69.0	10.5	79.4	1282	11.4	المحافظات الحضرية
358	41.4	5.8	40.3	77.6	8.7	85.3	3715	10.0	وجه بحري
96	36.6	4.0	35.1	68.8	13.8	82.5	880	12.2	حضر
262	43.2	6.4	42.3	80.9	6.8	86.3	2835	9.4	ريف
730	40.4	2.1	40.2	78.6	6.0	84.3	5355	14.9	وجه قبلي
153	33.5	1.8	33.5	71.9	6.7	77.4	1185	14.6	حضر
577	42.5	2.2	42.2	80.7	5.8	86.3	4170	15.0	ريف
37	(21.4)	(5.1)	(21.4)	(71.4)	(7.1)	(78.5)	662	5.7	محافظات الحدود ⁽²⁾
الحالة التعليمية									
119	46.3	4.3	46.3	77.2	10.1	85.3	1127	11.6	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
49	(34.7)	(9.4)	(32.3)	(58.5)	(10.1)	(68.6)	409	13.6	لم تتم المرحلة الابتدائية
377	42.4	5.2	41.7	74.5	10.7	84.4	2814	15.2	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
710	39.0	2.5	38.7	80.3	4.8	84.8	6664	11.2	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
1255	40.6	3.9	40.1	77.2	7.4	84.0	11014	12.4	الإجمالي

ملاحظة: الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرجحة.
 (1) محلول معالجة الجفاف يشمل محلولا معداً في عبوة محلول معالجة الجفاف والسوائل المنزلية أي محلول السكر والملح والماء.
 (2) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

جدول 20 انتشار ومعالجة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، حسب الخصائص الخلفية

نسبة الأطفال دون الخامسة المرضى بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة خلال الأسبوعين السابقين للمسح، ومن بين الأطفال المصابين نسبة الذين حصلوا على رعاية صحية، وأعطوا مضادات حيوية، والذين لم يحصلوا على استشارة أو علاج والذين حصلوا على زيادة في السوائل المقدمة، والذين حصلوا على زيادة/نفس كمية الطعام المقدمة، حسب الخصائص الخلفية، مصر ٢٠٢١.

عدد الأطفال المرضى	من بين الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة نسبة		استشارة مقدم صحة			عدد الأطفال أقل من 5 سنوات	نسبة الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة	الخصائص الخلفية
	عدم وجود استشارة/ علاج	أخذ مضادات حيوية	مقدم خدمة خاص 1:2	مقدم خدمة حكومي (١)	أي مقدم خدمة 1:2			
عمر الطفل بالشهور								
133	10.1	44.0	68.3	5.8	69.2	1072	13.4	أقل من 6
208	2.2	54.8	66.5	9.3	72.5	1040	20.5	11 – 6
439	4.5	53.8	60.9	8.3	64.0	2482	17.0	23 – 12
350	3.6	56.6	54.4	8.2	58.5	2529	14.4	35 – 24
299	3.7	55.0	47.6	7.7	53.6	2614	11.5	47 – 36
106	1.8	56.1	48.7	7.9	55.6	1277	8.8	59 – 48
النوع								
819	4.7	55.3	58.1	7.1	61.3	5597	14.8	ذكر
716	3.6	52.6	56.7	9.1	62.2	5417	13.5	أنثى
الإقامة								
416	4.9	53.0	55.4	9.8	61.5	3817	10.8	حضر
1119	3.9	54.4	58.1	7.4	61.8	7197	15.8	ريف
محل الإقامة								
90	8.8	50.1	47.5	3.4	48.9	1282	7.0	المحافظات الحضرية
470	4.4	54.1	58.6	8.5	64.4	3715	12.7	وجه بحري
110	3.2	53.2	57.9	12.7	67.5	880	12.8	حضر

تابع جدول 20 انتشار ومعالجة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، حسب الخصائص الخلفية

عدد الأطفال المرضى	من بين الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة نسبة		استشارة مقدم صحة			عدد الأطفال أقل من 5 سنوات	نسبة الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة	الخصائص الخلفية
	استشارة/ علاج	أخذ مضادات حيوية	مقدم خدمة خاص 1,2	مقدم خدمة حكومي ⁽¹⁾	أي مقدم خدمة 1,2			
360	4.8	54.3	58.8	7.2	63.5	2835	12.7	ريف
907	3.6	54.4	57.8	8.3	61.5	5355	17.4	وجه قبلى
167	4.2	54.7	57.4	11.7	64.1	1185	13.4	حضر
740	3.4	54.4	57.8	7.6	60.9	4170	18.6	ريف
68	3.2	55.7	57.0	4.9	56.8	662	10.3	محافظات الحدود ⁽³⁾
الحالة التعليمية								
155	9.2	55.2	41.9	12.2	49.5	1127	13.8	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
40	(17.3)	(42.9)	(41.9)	(4.7)	(44.7)	409	9.2	لم تتم المرحلة الابتدائية
399	3.7	55.2	52.0	12.8	61.6	2814	15.2	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوى
941	2.9	53.9	63.3	5.2	64.7	6664	14.1	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
1535	4.2	54.1	57.4	8.0	61.7	11014	14.2	الإجمالي
ملاحظة: الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرجحة. ⁽¹⁾ يمكن أن يتضمن أكثر من مصدر، حيث إنه من الممكن أن تكون هناك أكثر من إجابة. ⁽²⁾ لا تشمل الصيدلية والمصادر غير الطبية. ⁽³⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.								

جدول 21 الحالة التغذوية للأطفال

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر والذين تم تصنيفهم أنهم يعانون من سوء التغذية طبقاً لثلاثة مقاييس للوزن والطول والعمر للحالة التغذوية: الطول بالنسبة للعمر، الوزن بالنسبة للطول، والوزن بالنسبة للعمر، حسب الخصائص الخلفية للطفل، مصر 2021

عدد الأطفال	الوزن بالنسبة للعمر				الوزن بالنسبة للطول				الطول بالنسبة للعمر ⁽¹⁾			الخصائص الخلفية
	متوسط الدرجة المعيارية	نسبة الأطفال أعلى من 2+ انحراف معياري	نسبة الأطفال أقل من 2- انحراف معياري ⁽⁴⁾	نسبة الأطفال أقل من 3- انحراف معياري	متوسط الدرجة المعيارية	نسبة الأطفال أعلى من 2+ انحراف معياري	نسبة الأطفال أقل من 2- انحراف معياري ⁽³⁾	نسبة الأطفال أقل من 3- انحراف معياري	متوسط الدرجة المعيارية	نسبة الأطفال أقل من 2- انحراف معياري ⁽²⁾	نسبة الأطفال أقل من 3- انحراف معياري	
العمر بالأشهر												
767	0.3	4.8	4.8	1.1	6.5	24.8	7.0	3.2	0.4	16.9	7.8	أقل من 6 أشهر
388	0.5	4.8	4.6	1.7	3.1	15.4	3.3	1.1	0.3	12.5	3.9	6 – 8 أشهر
397	0.1	4.5	4.7	1.7	2.3	15.8	3.7	1.2	0.5	16.6	6.0	9 – 11 شهراً
987	0.3	4.4	4.3	0.7	1.5	12.7	4.8	2.3	0.6	18.5	5.6	12 – 17 أشهر
943	0.2	3.4	4.4	1.1	1.1	11.9	2.9	1.5	0.9	17.2	4.7	18 – 23 شهراً
1,963	0.5	3.8	3.8	1.0	1.3	9.6	2.1	1.0	0.8	14.8	4.2	24 – 35 شهراً
2,121	0.3	3.9	2.8	0.4	1.9	9.1	2.7	0.9	0.6	9.8	2.7	36 – 47 شهراً
2,451	0.2	4.5	3.0	0.6	2.6	9.2	2.0	0.8	0.4	7.9	1.9	48 – 59 شهراً
النوع												
5099	0.3	4.5	3.5	0.8	2.4	12.9	3.2	1.3	0.6	12.9	3.8	ذكر
4918	0.3	3.8	3.8	0.9	2.1	10.2	2.9	1.3	0.6	12.7	3.9	أنثى
الفترة بين المواليد بالأشهر ⁽⁵⁾												
2488	0.3	4.7	2.9	0.5	2.2	12.4	2.2	1.3	0.5	11.6	3.0	المولود الأول
1416	0.1	3.0	4.1	0.8	2.3	10.3	2.9	1.3	0.8	15.4	5.1	أقل من 24 شهراً
3389	0.3	3.8	3.5	0.9	1.9	11.4	3.8	1.4	0.6	13.3	4.3	24 – 47 شهراً
2573	0.6	4.5	4.4	1.0	2.7	11.6	2.6	1.2	0.5	12.3	3.6	48 فأكثر
حجم المولود عند الميلاد ⁽⁶⁾												
683	0.2	2.4	7.1	1.1	1.4	9.2	4.6	1.7	0.9	17.9	5.5	صغير جداً
1287	0.0	3.2	5.4	1.3	1.9	9.7	3.6	1.3	0.8	15.0	4.2	صغير
7781	0.4	4.4	3.1	0.7	2.4	12.1	2.9	1.3	0.5	12.1	3.7	متوسط أو كبير
115	0.1	5.8	3.1	0.7	1.6	9.9	2.2	0.2	0.5	12.5	3.0	بيانات مفقودة
حالة مقابلة الأم في المسح												
9866	0.3	4.1	3.7	0.8	2.2	11.6	3.1	1.3	0.6	12.9	3.9	قبولت
123	0.0	6.1	1.2	0.3	2.1	21.7	1.6	0.2	0.5	7.7	1.5	لم تقابل وفي الاسرة المعيشية
28	(0.1)	(0.0)	(8.3)	(8.3)	(0.3)	(0.7)	(8.3)	(8.3)	(0.6)	(11.6)	(3.3)	لم تقابل وليس في الأسرة المعيشية ⁽⁷⁾
الحالة التغذوية للأم ⁽⁶⁾												
59	0.6	0.0	12.2	3.1	0.0	5.2	6.4	0.0	1.0	18.1	5.3	نحيف (مؤشر كتلة الجسم <18.5)
1940	0.1	3.4	3.8	0.9	1.8	10.3	3.6	1.3	0.7	16.0	5.1	طبيعي (مؤشر كتلة الجسم 18.5-24.9)

تابع جدول 21 الحالة التغذوية للأطفال

عدد الأطفال	الوزن بالنسبة للعمر				الوزن بالنسبة للطول				الطول بالنسبة للعمر ⁽¹⁾			الخصائص الخلفية
	متوسط الدرجة المعيارية	نسبة الأطفال أعلى من 2+ انحراف معياري	نسبة الأطفال أقل من 2- انحراف معياري ⁽⁴⁾	نسبة الأطفال أقل من 3- انحراف معياري	متوسط الدرجة المعيارية	نسبة الأطفال أعلى من 2+ انحراف معياري	نسبة الأطفال أقل من 2- انحراف معياري ⁽³⁾	نسبة الأطفال أقل من 3- انحراف معياري	متوسط الدرجة المعيارية	نسبة الأطفال أقل من 2- انحراف معياري ⁽²⁾	نسبة الأطفال أقل من 3- انحراف معياري	
7129	0.4	4.3	3.4	0.7	2.3	11.7	3.0	1.3	0.5	11.7	3.5	زيادة في الوزن/سمنة (مؤشر كتلة الجسم ≤ 25)
الإقامة												
3598	0.3	5.1	4.5	1.2	2.7	12.8	4.1	1.7	0.5	11.9	3.9	حضر
6419	0.3	3.5	3.1	0.6	1.9	10.8	2.4	1.0	0.6	13.4	3.8	ريف
محل الإقامة												
1196	0.1	4.2	5.9	2.2	2.9	11.0	4.4	1.6	0.6	12.7	4.8	محافظات حضرية
3386	0.8	6.1	2.1	0.3	2.7	14.6	2.1	1.1	0.4	10.2	3.2	وجه بحري
863	1.1	8.5	2.3	0.3	3.2	18.9	2.3	1.2	0.3	9.5	3.0	حضر
2,523	0.7	5.1	2.0	0.3	2.6	3.1	2.1	1.1	0.4	10.4	3.3	ريف
4,903	0.1	2.3	3.4	0.9	1.5	8.8	3.5	1.4	0.8	15.2	4.1	وجه قبلي
1170	0.0	3.4	4.9	0.9	2.1	9.7	5.5	2.4	0.6	12.8	3.6	حضر
3733	0.1	1.9	4.1	0.9	1.3	8.5	2.8	0.9	0.8	16.2	4.3	ريف
532	0.1	2.5	4.3	1.0	1.1	9.8	2.0	1.3	0.8	16.3	4.9	محافظات الحدود ⁽⁸⁾
الحالة التعليمية												
1075	0.2	1.7	6.1	1.5	2.9	9.8	2.5	1.0	0.9	19.1	7.2	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
499	0.7	3.5	5.2	1.3	1.4	8.7	4.8	1.9	0.8	15.2	4.8	لم تتم المرحلة الابتدائية
2,389	0.4	3.8	3.1	0.4	2.0	11.2	2.8	1.2	0.7	14.0	4.0	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
5903	0.4	4.7	3.4	0.8	2.3	12.3	3.1	1.3	0.5	11.2	3.2	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
10017	0.3	4.1	3.7	0.8	2.2	11.5	3.1	1.3	0.6	12.8	3.8	الإجمالي
ملاحظة: الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية. تم حساب كل مؤشر بدلالة عدد وحدات الانحراف المعياري من وسيط المجتمع المرجعي الدولي الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية المطبق في 2006. وبالتالي فإن المؤشرات في هذا الجدول غير قابلة للمقارنة مع المجتمع المرجعي الذي يتم استخدامه من قبل، والخاص بالمركز الدولي للإحصاءات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية/مركز الولايات المتحدة لمراقبة المرض/منظمة الصحة العالمية. الجدول مبني على الأطفال الذين لديهم تواريخ ميلاد ثابتة (شهر وسنة) ومقاييس الوزن والطول. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرجحة.												
(1) تم قياس الطول للأطفال دون سن سنتين في وضع راقيدين، أو في عدد قليل من الحالات عندما يكون عمر الطفل غير معروف وطول الطفل أقل من 85 سم؛ وتم قياس الطول في وضع واقفاً لجميع الأطفال الآخرين.												
(2) تشمل الأطفال أقل من 3- انحراف معياري من وسيط المجتمع المرجعي الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية.												
(3) يستبعد الأطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاتهم.												
(4) التوائم (ثلاثة توائم... إلخ) المولودون أولاً تم جمعهم في الترتيب الأول لأنهم لا توجد فترة بينهم.												
(5) تشمل الأطفال الذين توفيت أمهاتهم.												
(6) قد تم استبعاد الأطفال الذين يتم قياس وزن أمهاتهم، الأطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاتهم، والأطفال الذين كانت أمهاتهم حاملات أو أنجبت طفلاً خلال الشهرين السابقين، الحالة التغذوية للأم المعبر عنها بمؤشر كتلة الجسم معروضة في جدول 11-12.												
(7) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.												
(8) بالنسبة للسيدات اللاتي لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استمارة الأسرة المعيشية. ويستبعد الأطفال الذين لم يسجل أمهاتهم في جدول الأسرة المعيشية.												

جدول 22 انتشار الأنيميا بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً

نسبة الأطفال في العمر 6-59 شهراً الذين تم تصنيفهم كمصابين بالأنيميا، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

حالة الأنيميا حسب مستوى الهيموجلوبين في الدم					الخصائص الخلفية
عدد الأطفال	حادة (7,0 جم/ديسيلتر)	متوسطة (7,0-9,9 جم/ديسيلتر)	بسيطة (10,0-10,9 جم/ديسيلتر)	أي أنيميا (11 > جم/ديسيلتر)	
العمر بالأشهر					
195	1.1	37.7	26.0	64.8	8 – 6
231	0.2	39.7	27.3	67.3	11 – 9
588	1.5	37.7	21.6	60.8	17 – 12
548	1.7	26.9	21.5	50.1	23 – 18
1162	1.1	19.6	23.1	43.8	35 – 24
1265	1.3	14.3	21.6	37.3	47 – 36
1343	1.7	12.3	15.7	29.7	59 – 48
النوع					
195	1.6	21.3	20.6	43.5	ذكر
231	1.2	20.2	21.1	42.5	أنثى
الإقامة					
1861	2.1	19.4	21.0	42.5	حضر
3473	0.9	21.6	20.7	43.3	ريف
محل الإقامة					
580	2.2	20.0	19.5	41.8	المحافظات الحضرية
1811	0.7	19.2	21.0	40.9	وجه بحري
453	1.4	19.8	22.9	44.1	حضر
1358	0.4	18.9	20.3	39.7	ريف
2608	1.8	22.4	21.0	45.2	وجه قبلى
598	2.6	17.8	21.1	41.4	حضر
2010	1.5	24.2	20.9	46.7	ريف
335	0.5	23.5	25.2	49.1	محافظات الحدود ⁽²⁾
الحالة التعليمية للأم ⁽³⁾					
622	1.8	24.1	21.7	47.6	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
238	1.6	18.6	120.0	42.1	لم تتم المرحلة الابتدائية
1284	0.3	21.9	22.9	45.1	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوى
3105	1.6	19.9	20.0	41.5	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
5334	1.4	20.8	20.9	43.0	الإجمالى

ملاحظة: الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية والذين تم إجراء اختبار الأنيميا لهم. يعتمد انتشار الأنيميا على مستويات الهيموجلوبين في الدم والمعدل للارتفاع. تم قياس الهيموجلوبين بالجرامات لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر).

⁽¹⁾ تشمل الأطفال الذين توفيت أمهاتهم.

⁽²⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

⁽³⁾ بالنسبة للسيدات اللاتي لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استمارة الأسرة المعيشية. ويستبعد الأطفال الذين لم تسجل أمهاتهم في جدول الأسرة المعيشية.

جدول 23 انتشار ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج فى العمر 15 – 49		
نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج فى العمر 15 – 49 وتم ختانهن حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021		
الخصائص الخلفية	نسبة اللاتي تم ختانهن	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج فى العمر 15 – 49
العمر		
19 – 15	66.5	397
24 – 20	71.3	2157
29 – 25	77.5	3267
34 – 30	85.2	4135
39 – 35	89.4	4195
44 – 40	93.0	3586
49 – 45	94.4	2744
الإقامة		
حضر	79.2	8138
ريف	89.5	12343
محل الإقامة		
المحافظات الحضرية	75.8	3007
وجه بحري	84.1	7986
حضر	76.7	2103
ريف	86.6	5883
وجه قبلى	91.5	8399
حضر	86.8	2276
ريف	93.4	6123
محافظات الحدود ⁽¹⁾	62.0	1089
الحالة التعليمية		
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	94.9	3281
لم تتم المرحلة الابتدائية	89.8	892
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	85.9	4216
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	82.4	12092
الحالة العملية		
تحصل على عائد نقدى	85.3	3258
لا تحصل على عائد نقدى	85.6	17223
الإجمالي	85.6	20481
⁽¹⁾ لا تتضمن محافظة شمال سيناء.		

جدول 24 نسب انتشار وتوقع ختان الإناث بين البنات

نسبة البنات في العمر 0-19 واللاتي تم ختانهن، ونسبة اللاتي لم يتم ختانهن ولكن لدى أمهاتهن نية ختانهن في المستقبل، والنسبة المتوقعة ختانهن بالأخذ في الاعتبار حالة الختان الحالية ونية الأم، حسب العمر الحالي للبنات، مصر 2021

العمر الحالي للبنات	نسبة المختنات	نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل	النسبة المتوقعة ختانهن	عدد البنات
0 – 2	0.4	20.4	20.8	3489
3 – 4	1.7	19.9	21.6	2686
5 – 6	3.0	20.1	23.1	2979
7 – 8	5.1	15.4	20.5	2966
9 – 10	9.4	13.8	23.3	2787
11 – 12	17.4	9.7	27.1	2586
13 – 14	27.5	4.3	31.8	2344
15 – 17	36.8	2.1	38.9	2775
18 – 19	45.8	1.1	46.8	1570
الإجمالي	14.2	12.8	27.0	24182

جدول 25 الشخص القائم بعملية الختان بين البنات حسب الإقامة

التوزيع النسبي للبنات في العمر 0 – 19 اللاتي ذكرت أمهاتهن أنه تم ختانهن،
حسب الشخص القائم بالختان، حسب الإقامة (حضر – ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021

الإجمالي	محل الإقامة								الإقامة		الشخص القائم بالتختان
	محافظات الحدود ⁽¹⁾	وجه قبلي			وجه بحري			محافظات حضرية			
		ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي		ريف	حضر	
73.8	79.3	72.1	81.2	74.1	73.4	63.6	72.1	75.6	72.4	78.1	طبيب
9.3	3.8	9.9	7.1	9.3	10.4	7.8	10.0	6.6	10.0	6.9	ممرضة/عاملين بالصحة آخرين
15.8	16.9	17.3	10.4	15.7	13.8	28.6	15.7	17.5	16.4	14.1	داية
0.9	0.0	0.6	0.8	0.6	2.0	0.0	1.8	0.2	1.0	0.5	حلاق صحة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	غجرية أخرى
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	أخرى
0.2	0.0	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	لا يعرف
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	إجمالي النسبة
3993	183	2223	709	2932	616	97	713	165	2903	1090	العدد
لا تتضمن محافظة شمال سيناء.											

جدول 26 صور العنف من قبل الزوج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي أقررن بتعرضهن لصور العنف المختلفة من قبل الزوج سواء كان في الـ 12 شهراً السابقة عن المسح أو في أي وقت آخر، مصر 2021

صور العنف				سبق في أي وقت	في الـ 12 شهراً السابقة عن المسح
					غالباً أو أحياناً
العنف المُرتكب من قبل الزوج الحالي/الأخير					
العنف الجسدي					
أي عنف جسدي	25.5	5.6	10.1	15.8	
دفع أو نفض السيدة بقوة أو قذفها بشيء	14.8	3.7	5.1	8.7	
الصفع	21.9	4.1	6.6	10.7	
لي الذراع أو جذبها من شعرها	13.2	3.1	4.1	7.2	
اللكم بقبضة اليد أو بشيء آخر يمكن أن يؤذيها	8.1	2.1	2.2	4.3	
ركلها، جرها، أو ضربها	6.0	1.6	1.4	3.0	
محاولة خنقها/حرقها عن قصد	2.0	0.5	0.5	1.0	
تهديدها أو الهجوم عليها بالسكين، مسدس، أو بأسلحة أخرى	1.3	0.3	0.3	0.6	
العنف الجنسي					
أي عنف جنسي	5.6	1.8	2.1	3.9	
أجبرن على ممارسة الجنس وهن لا يرغبن	4.9	1.6	1.6	3.2	
أجبرن على أفعال جنسية وهن لا يرغبن بها	2.6	1.0	0.7	1.6	
أجبرن تحت التهديد على أفعال جنسية وهن لا يرغبن	1.4	0.5	0.3	0.8	
العنف النفسي					
أي عنف نفسي	22.3	7.0	9.6	16.7	
قال أو فعل أي شيء بهدف إهانة السيدة أمام آخرين	13.5	3.8	4.7	8.4	
قام بإذائها أو ضربها أمام أحد ما هي تهتم بشأنه	6.0	2.0	1.8	3.8	
أهانها أو جعلها تتحسر على نفسها	19.3	6.0	6.7	12.7	
أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/أو الجنسي	26.1	6.2	10.9	17.1	
أي شكل من أشكال العنف النفسي و/أو الجسدي و/أو الجنسي	31.0	9.0	15.3	24.4	
العنف المُرتكب من قبل أي زوج					
العنف الجسدي	26.0	ل.ي	ل.ي	15.8	
العنف الجنسي	5.9	ل.ي	ل.ي	3.9	
العنف الجسدي و/أو الجنسي	26.6	ل.ي	ل.ي	17.1	
عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	9071	9071	9071	9071	
ملحوظة: تم الحصول على معلومات تفصيلية عن أنواع العنف من قبل الزوج الحالي للمتزوجات حالياً أو الزوج الأخير للسيدات المطلقات أو الأرمال، بالنسبة للسيدات اللاتي تزوجن أكثر من مرة، فإن المعلومات عن العنف من قبل الزوج السابق كان فقط للعنف البدني والجنسي الذي سبق وتعرضت له خلال العام السابق على المسح.					
ل.ي = لا ينطبق					

جدول 27 عمالة الأطفال							
عدد الأطفال في العمر 5-17 سنة	إجمالي عمالة الأطفال	الأطفال الذين عملوا في ظروف خطيرة ⁽²⁾	الأطفال الذين شاركوا في أعمال منزلية لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق:		الأطفال الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق:		الخصائص الخلفية
			المحدد ⁽¹⁾ في فئة السن منها	تحت فئة السن المحدد ⁽¹⁾	المحدد ⁽¹⁾ في فئة السن منها	تحت فئة السن المحدد ⁽¹⁾	
النوع							
8383	7.7	5.4	0.7	99.3	5.6	94.4	ذكر
8012	3.4	1.1	1.1	98.9	2.2	97.8	انثى
العمر							
9109	3.0	1.1	0.7	99.3	2.3	97.7	11 – 5
4111	5.5	3.8	1.7	98.3	2.0	98.0	14 – 12
3175	13.1	8.9	0.4	99.6	11.0	89.0	17 – 15
الإقامة							
6913	3.5	1.8	0.7	99.3	2.3	97.7	حضر
9482	6.9	4.2	1.1	98.9	4.9	95.1	ريف
محل الإقامة							
2560	2.7	1.7	0.4	99.6	1.5	98.5	المحافظات الحضرية
6158	4.9	2.6	0.4	99.6	3.7	96.3	وجه بحري
1767	2.9	1.1	0.3	99.7	2.5	97.5	حضر
4391	5.7	3.2	0.5	99.5	4.1	95.9	ريف
6690	7.4	4.6	1.6	98.4	5.1	94.9	وجه قبلي
1901	5.1	2.7	1.4	98.6	3.2	96.8	حضر
4789	8.4	5.4	1.7	98.3	5.9	94.1	ريف
987	2.6	1.2	0.6	99.4	1.1	98.9	محافظات الحدود ⁽³⁾
الالتحاق بالمدرسة							
14427	5.3	3.1	0.9	99.1	3.8	96.2	ملتحق بالمدرسة
1968	7.7	4.6	1.2	98.8	4.9	95.1	غير ملتحق بالمدرسة
مستوى تعليم الأم							
3032	8.9	5.9	1.3	98.7	6.4	93.6	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
629	12.7	9.5	0.9	99.1	9.3	90.7	لم تتم المرحلة الابتدائية
2388	5.5	4.3	0.6	99.4	3.8	96.2	أتمت المرحلة الابتدائية/
							بعض الثانوي
3158	2.2	0.8	0.5	99.5	1.4	98.6	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
7188	4.9	2.2	1.0	99.0	3.4	96.6	لم يُحدد ⁽⁴⁾
مستوى تعليم الأب							
1840	8.5	6.3	1.0	99.0	6.5	93.5	لم يسبق له الذهاب للمدرسة
872	8.6	5.6	1.3	98.7	5.1	94.9	لم يتم المرحلة الابتدائية
2209	7.4	5.2	1.0	99.0	5.5	94.5	أتم المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي
3135	2.8	1.1	0.6	99.4	2.1	97.9	أتم المرحلة الثانوية/ فأعلى
8339	5.1	2.6	0.9	99.1	3.4	96.6	لم يُحدد ⁽⁴⁾
16395	5.6	3.3	0.9	99.1	3.9	96.1	الإجمالي
ملحوظة: تستند الفئات العمرية المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات التي وضعها اليونيسيف في برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات. لمزيد من المعلومات عن المسح العنقودي متعدد المؤشرات وبرنامج وحدة عمالة الأطفال http://mics.unicef.org .							
(1) يشمل أولئك الذين لم يشاركوا إطلاقاً.							
(2) تعتبر الأحمال خطرة إذا كانت تنطوي على تحمل أحمال ثقيلة، العمل مع الأدوات الخطرة أو تشغيل لمعدات ثقيلة والعمل على ارتفاعات، والعمل مع المواد الكيميائية أو المتفجرات، والتعرض للغبار والأبخرة والغازات والحرارة الشديدة أو الرطوبة والضوضاء الصاخبة أو الاهتزازات أو أي ظروف أخرى تعتبر سيئة لصحة وسلامة الطفل.							
(3) لا يتضمن محافظة شمال سيناء.							
(4) لم تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفياً أو لم يكن عضواً في الأسرة المعيشية أو كان زائراً.							

جدول 28 ضبط سلوك الأطفال	
نسبة الأطفال في العمر 1-14 سنة وفقاً للعد النظري الذين تم استخدام أحد أساليب ضبط السلوك معهم في الشهر السابق عن وقت إجراء المقابلة، مصر 2021	
الإجمالي	أسلوب ضبط السلوك
أساليب ضبط السلوك غير العنيفة	
39.5	حرمان الطفل من شيء يحبه، إبعاد بعض المزايا عنه، أو حرمانه من مغادرة المنزل
81.2	توضيح أن سلوك الطفل كان خطأ
38.1	إعطاء الطفل شيئاً آخر ليفعله
أساليب ضبط السلوك العنيفة	
	العقاب النفسي
74.9	الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ مع الطفل
47.8	وصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي شيء مُشابه
العقاب الجسدي	
32.1	هز الطفل
39.8	ضرب الطفل على يديه أو ذراعه أو ساقه
18.9	ضرب الطفل على جزئه السفلي باليد فقط
14.2	ضرب الطفل على جزئه السفلي أو أي جزء من جسده بحزام أو فرشاة شعر أو عصا أو أي شيء صلب آخر
العقاب الجسدي الشديد	
25.0	ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الأذنين
5.3	ضرب الطفل بشدة وبتكرارية
8.5	لا يوجد أي أسلوب
8381	عدد الأطفال

جدول 29 المواليد بين الأطفال الأقل من 5 سنوات				
نسبة الأطفال دون سن الخامسة من العمر وفقاً للعدد الفعلي الذين تم تسجيل ولادتهم مع السلطات المدنية، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021				
عدد الأطفال	الأطفال الذين تم تسجيل ولادتهم			الخصائص الخلفية
	نسبة المسجلين	نسبة من لا يمتلك شهادة ميلاد	نسبة من لديه شهادة ميلاد	
العمر				
4788	98.3	1.2	97.1	أقل من 2
8217	99.5	0.3	99.2	2 – 4
النوع				
6633	99.1	0.6	98.5	ذكر
6372	99.0	0.7	98.3	أنثى
				الإقامة
4733	99.3	0.5	98.8	حضر
8272	98.9	0.7	98.2	ريف
محل الإقامة				
1573	99.2	0.2	99.0	المحافظات الحضرية
4469	99.4	0.6	98.8	وجه بحري
1130	99.2	0.6	98.6	حضر
3339	99.5	0.6	98.9	ريف
6177	98.7	0.8	97.9	وجه قبلي
1472	99.5	0.7	98.8	حضر
4705	98.5	0.8	97.6	ريف
786	99.3	0.3	99.0	محافظات الحدود ⁽¹⁾
13005	99.1	0.6	98.4	الإجمالي
⁽¹⁾ لا يتضمن محافظة شمال سيناء.				

جدول 30 مؤشر نمو الطفل المبكر						
نسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و59 شهراً والذين يسبقون على المسار الصحيح في مجالات معرفة القراءة والكتابة والحساب والجسدية والاجتماعية والعاطفية والتعلم، ودرجة مؤشر نمو الطفل المبكر، حسب خصائص الخلفية، مصر 2021						
الخصائص الخلفية	والحساب والقراءة	الجسدية	والعاطفية والاجتماعية	التعلم	نمو الطفل المبكر	عدد الأطفال
عمر الطفل						
47 – 36	47.1	93.8	97.2	85.7	85.4	2400
59 – 48	(58.4)	(96.2)	(95.2)	(78.0)	(80.7)	37
النوع						
ذكر	45.3	94.6	97.2	85.8	85.4	1272
أنثى	49.6	93.0	97.2	85.2	85.2	1165
الإقامة						
حضر	49.2	94.5	96.9	86.2	85.9	879
ريف	46.3	93.5	97.3	85.2	85.0	1558
محل الإقامة						
المحافظات الحضرية	49.5	93.6	97.2	82.4	81.4	296
وجه بحري	46.5	95.0	97.3	83.4	84.8	872
حضر	45.7	97.5	97.9	85.4	86.6	208
ريف	46.7	94.2	97.2	82.8	84.3	664
وجه قبلي	47.8	92.9	97.0	88.4	86.8	1143
حضر	51.7	93.2	95.6	90.7	89.6	285
ريف	46.3	92.8	97.5	87.6	85.7	858
محافظات الحدود ⁽¹⁾	39.0	93.2	100.0	85.2	86.5	126
الحالة التعليمية للأم						
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	29.6	93.2	98.6	81.3	81.7	264
لم تتم المرحلة الابتدائية	36.7	89.6	95.2	79.8	75.5	79
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوى	41.1	91.9	97.2	84.2	82.5	577
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	53.4	94.9	97.1	87.1	87.6	1517
الإجمالي	47.3	93.8	97.2	85.5	85.3	2437
ملاحظة: الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25 – 49 حالة غير مرجحة. (1) لا تتضمن محافظة شمال سيناء.						

الشباب / الشبابات

جدول 31 الخصائص الخلفية للشباب			
التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفى الفئة العمرية 15-29 حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021			
الخصائص الخلفية	النسبة المرحجة	العدد المرجح	العدد غير المرجح
العمر			
19 – 15	54.7	9622	9389
24 – 20	32.3	5694	5792
29 – 25	13.0	2287	2422
النوع			
ذكر	58.6	10319	10381
أنثى	41.4	7284	7222
الإقامة			
حضر	45.5	8007	8384
ريف	54.5	9596	9219
محل الإقامة			
المحافظات الحضرية	18.5	3265	3222
وجه بحري	41.4	7281	6276
حضر	12.6	2212	2069
ريف	28.8	5070	4207
وجه قبلى	38.9	6854	7091
حضر	13.5	2385	2353
ريف	25.4	4469	4738
محافظات الحدود ⁽¹⁾	1.1	202	1014
الإجمالي	100.0	17603	17603
⁽¹⁾ لا تتضمن محافظة شمال سيناء.			

جدول 32 الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة وفقا للخصائص الخلفية

نسبة الشباب في العمر 15-29 سنة الذين وافقوا على استخدام وسائل لتنظيم الأسرة قبل أول حمل وبعد أول مولود، حسب العمر والخصائص الخلفية، مصر 2021

الخصائص الخلفية			الاناث في العمر 15 - 29			الذكور في العمر 15 - 29			الإجمالي		
العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود	العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود	العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود	العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود
الإقامة											
حضر	19.6	79.4	3606	23.5	65.2	4778	21.9	71.3	8384		
ريف	15.2	77.0	3616	14.7	62.4	5603	14.9	68.2	9219		
محل الإقامة											
المحافظات الحضرية	20.2	79.7	1408	26.0	63.5	1814	23.5	70.6	3222		
وجه بحري	18.3	82.0	2537	16.3	72.0	3739	17.1	76.1	6276		
حضر	20.2	82.6	892	18.9	73.8	1177	19.5	77.7	2069		
ريف	17.4	81.7	1645	15.2	71.2	2562	16.1	75.4	4207		
وجه قبلى	14.9	73.3	2824	17.9	55.6	4267	16.7	62.8	7091		
حضر	18.8	76.2	970	24.9	60.8	1383	22.4	67.1	2353		
ريف	12.8	71.7	1854	14.2	52.9	2884	13.6	60.4	4738		
محافظات الحدود ⁽¹⁾	10.9	72.2	453	11.7	40.4	561	11.3	54.5	1014		
الحالة التعليمية											
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	14.1	63.1	83	14.3	49.0	77	14.2	56.0	160		
لم تتم المرحلة الابتدائية	10.6	66.3	87	13.6	53.4	354	13.0	55.9	441		
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	13.2	74.2	3358	14.1	55.9	4126	13.7	64.1	7484		
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	21.4	82.5	3694	22.4	70.3	5824	22.0	75.1	9518		
الحالة العملية											
تحصل على عائد نقدي	23.0	81.4	755	19.0	65.3	6040	19.5	67.2	6795		
لا تحصل على عائد نقدي	16.6	77.7	6467	18.0	61.4	4341	17.2	71.1	10808		
الإجمالي	17.3	78.1	7222	18.6	63.6	10381	18.1	69.6	17603		

⁽¹⁾ لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

جدول 33 العدد الأمثل للأطفال

التوزيع النسبي للشباب في العمر 15–29 سنة حسب العدد الأمثل للأطفال، ومتوسط العدد الأمثل للأطفال للأنثى و الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج، في مصر 2021

العدد الأمثل للأطفال	إناث	ذكور	الإجمالي
0	1.2	0.2	0.6
1	3.5	2.4	2.9
2	61.9	46.1	52.6
3	21.3	32.3	27.7
4	8.6	12.4	10.8
5	0.8	1.8	1.4
+ 6	0.6	1.2	1.0
إجابة غير عددية	2.1	3.6	3.0
الإجمالي	100.0	100.0	100.0
متوسط العدد الأمثل للأطفال ⁽¹⁾	2.4	2.7	2.6
عدد المستجيبين	7222	10381	17603
⁽¹⁾ المتوسطات لا تشمل المستجيبين الذين أجابوا إجابة غير عددية.			



فهرس

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة
٥	خلفية المسح
٥	منهجية وعينة المسح
٦	تغطية المسح
٨	خصائص الأسر المعيشية والمستجيبات
أهم المؤشرات	
١٠	الإنجاب
١٤	تنظيم الأسرة
١٨	وفيات الأطفال
٢٠	رعاية الحمل
٢٢	التطعيمات وصحة الطفل
٣١	العنف ضد المرأة
٣٤	عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل
٣٧	الشباب
٤٠	بعض مؤشرات التنمية المستدامة
ملحق الجداول	
٤٤	خصائص الأسر المعيشية والمستجيبات
٤٨	الإنجاب
٥٢	تنظيم الأسرة
٥٦	وفيات الأطفال ووفيات الرضع
٥٨	رعاية الأمومة
٦٢	التطعيمات وصحة ونماء الطفل
٧٩	الشباب / الشابات



مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع

شارع المرور - الدراسة تليفون ٢٥٩٠٢٠٢٠ - ٢٥٩٠٢٥٢٥ - ٢٥٩٣٦٥٥ فاكس
www.policepress.com.eg E-mail: info@policepress.com.eg